



中华人民共和国国家标准

GB 15989—1995

疟疾诊断标准及处理原则

Diagnostic criteria and principles
of management of malaria

1996-01-23 发布

1996-07-01 实施

国家技术监督局 发布
中华人民共和国卫生部

中华人民共和国国家标准

疟疾诊断标准及处理原则

GB 15989—1995

Diagnostic criteria and principles of management of malaria

根据《中华人民共和国传染病防治法》及《中华人民共和国传染病防治法实施办法》制订本标准。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了疟疾的诊断标准及处理原则。

本标准适用于各级各类防疫和医疗卫生机构对疟疾的诊断和处理。

2 诊断原则

根据疟区住宿史,发病时有定期发冷、发热、出汗等临床症状,脾肿大等体征,以及病原学检查、血清免疫学检查等结果,予以诊断。

3 诊断标准

3.1 曾于疟疾传播季节在疟疾流行区住宿,或有输血史。

3.2 间歇性定时发作,每天、隔天或隔两天发作一次。发作时有发冷、发热、出汗等临床症状。发作多次可出现脾肿大和贫血。重症病例出现昏迷等症状(详见附录 C)。

3.3 用抗疟药作假定性治疗,3天内症状得到控制者。

3.4 间接荧光抗体试验或酶联免疫吸附试验抗体阳性(详见附录 B)。

3.5 血涂片查见疟原虫。其种类有间日疟原虫、恶性疟原虫,三日疟原虫和卵形疟原虫(详见附录 A)。

疑似病例:具备 3.1 与 3.2。

临床诊断:疑似病例加 3.3 或 3.4。

确诊病例:疑似病例加 3.5。按查见的疟原虫种类,分为间日疟、恶性疟、三日疟和卵形疟。

4 处理

4.1 治疗

4.1.1 间日疟、三日疟和卵形疟治疗

成人量氯喹 1.2~1.5g 3 日分服(第 1 日 0.6g,第 2、3 日各 0.3 或 0.45g),加伯氨喹 90~180mg 4~8 日分服(每日 22.5mg)。

4.1.2 恶性疟治疗

4.1.2.1 对氯喹未产生抗性地区恶性疟治疗 成人量氯喹 1.2~1.5g 3 日分服(第 1 日 0.6g,第 2、3 日各 0.3 或 0.45g),加伯氨喹 67.5mg 3 日分服(每日 22.5mg)。

4.1.2.2 对氯喹产生抗性地区恶性疟治疗 任选以下方案之一:哌喹 1.5g 3 日分服,加伯氨喹 45 或 67.5mg 2 日或 3 日分服;咯萘啶 1.2g 加磺胺多辛 1.0g 2 日分服,加伯氨喹 45 或 67.5mg 2 日或 3 日分服;咯萘啶 0.8~1.0g 加磺胺多辛 1.0~1.5g 加乙胺嘧啶 50~75mg,均 2 日分服;青蒿琥酯钠 600mg 5

国家技术监督局 1995-12-15 批准

1996-07-01 实施