



中华人民共和国国家标准

GB/T 14926.57—2001

实验动物 犬细小病毒检测方法

Laboratory animal
—Method for examination of canine parvovirus(CPV)

2001-08-29 发布

2002-05-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前　　言

本标准规定了犬细小病毒的检测方法。

犬细小病毒性肠炎是犬的主要烈性传染病之一，在我国犬群中广泛流行，是普通级犬和 SPF 犬的必检项目。因此增加该病毒的检测方法。

本标准由中华人民共和国科学技术部提出并归口。

本标准起草单位：中国实验动物学会。

本标准主要起草人：田克恭。

中华人民共和国国家标准

实验动物 犬细小病毒检测方法

GB/T 14926.57—2001

Laboratory animal—Method for examination of
canine parvovirus (CPV)

1 范围

本标准规定了犬细小病毒(CPV)的检测方法、试剂等。

本标准适用于犬 CPV 的检测。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 14926.50—2001 实验动物 酶联免疫吸附试验

GB/T 14926.54—2001 实验动物 血凝抑制试验

3 原理

根据免疫学原理,采用 CPV 抗原检测犬血清中 CPV 抗体;或根据 CPV 在一定的条件下,能凝集猪红细胞,这种凝集红细胞的能力可被特异性抗体所抑制的原理,检测犬血清中 CPV 抗体。

4 主要试剂和器材

4.1 试剂

4.1.1 ELISA 抗原

4.1.1.1 特异性抗原

CPV 感染 FK81 细胞,接种 3~5 d 后,当病变达+++-+++-时收获。冻融三次或超声波处理后,低速离心去除细胞碎片,上清液再经超速离心浓缩后制成 ELISA 抗原。

4.1.1.2 正常抗原

FK81 细胞冻融破碎后,经低速离心去除细胞碎片而获得的上清液。

4.1.2 血凝素

CPV 接种 FK81 细胞,培养 3~5 d,当病变达+++-+++-时收获。冻融三次或超声波处理后,低速离心去除细胞碎片,上清液分装后低温保存。

4.1.3 阳性血清

CPV 实验感染或自然感染的犬血清。

4.1.4 阴性血清

无 CPV 感染、未经免疫的犬血清。