

ICS 11.220
B 41

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 549—2002

赤羽病细胞微量中和试验方法

Cells microneutralization test for akabane disease

2002-08-27 发布

2002-12-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前 言

赤羽病(akabane disease,又名阿卡斑病)是由赤羽病病毒(akabane disease virus)引起的牛、绵羊和山羊的一种多型性传染病。该病以流产、早产、死胎、畸形产为特征,能引起先天性关节弯曲和积水性无脑症。

本病的病原是赤羽病病毒,属布尼病毒科布尼病毒属,病毒表面有两种糖蛋白(G1和G),它们分别诱导中和抗体和血凝抑制抗体产生。本病的血清学诊断方法为细胞微量中和试验。

本标准由农业部畜牧兽医局提出。

本标准由全国动物检疫标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:农业部动物检疫所。

本标准主要起草人:周立桥、李昌琳、封启民、李其平。

赤羽病细胞微量中和试验方法

1 范围

本标准规定了赤羽病(akabane disease)细胞微量中和试验技术要求。
本标准适用于牛、羊赤羽病感染的定性以及免疫群体抗体水平的评估。

2 材料准备

- 2.1 96孔细胞培养物,移液器(50 μ L、200 μ L)滴头,无毒透明塑料胶带,小试管。
- 2.2 Vero 细胞或 SVP 细胞。
- 2.3 抗原、标准阳性血清、标准阴性血清。
- 2.4 被检血清,无菌采集,不加防腐剂。

3 操作方法

3.1 准备

- 3.1.1 取一支已知滴度的赤羽病病毒(AKV),用 199 细胞培养液稀释成 100TCID₅₀/50 μ L,作为工作浓度抗原。
- 3.1.2 被检血清、标准阳性血清、标准阴性血清均 56℃ 灭活 30 min,用 199 液做 1:4 稀释(即 50 μ L 血清加入 150 μ L 199 液中)。
- 3.1.3 按常规微量中和试验法每个样品接种 4 孔,每孔分别加被检稀释血清和工作浓度抗原各 50 μ L,轻轻振荡培养板使抗原与稀释血清充分混合,将培养板加盖置 37℃ 培养箱内中和 1 h。
- 3.1.4 每孔滴加 SVP 细胞或 Vero 细胞悬液(20 万/mL)100 μ L,用透明塑料胶带封板,置 37℃ 温箱内培养,用倒置显微镜观察细胞病变情况(通常 72 h 内引起细胞病变)。

3.2 对照设置

每次试验均要设置标准阳性、阴性血清对照、病毒对照、正常细胞对照和抗原实际用量的回归滴度对照。

- 3.2.1 标准阳性、阴性血清对照,将已稀释好的标准阳性、阴性血清分别加入培养板 4 孔内,每孔 50 μ L,然后各孔加入工作浓度抗原 50 μ L。
- 3.2.2 病毒对照:将工作浓度抗原滴加培养板 4 孔内,每孔 50 μ L,补加细胞生长液 50 μ L。
- 3.2.3 将以上三种对照置 37℃ 温箱内 1 h,然后于各孔内加入 100 μ L 细胞悬液,置 37℃ 温箱内培养,72 h 后在倒置显微镜下观察结果。
- 3.2.4 正常细胞对照:于培养板 4 孔内各加 100 μ L 细胞悬液,然后再于各孔补加细胞生长液 100 μ L。
- 3.2.5 抗原实际用量的回归滴度的测定:在每次试验中,应对使用的 100TCID₅₀/50 μ L 抗原进行实际用量的测定,将工作浓度抗原作 10 倍递增稀释到 10⁻³,每个稀释度接种 4 孔,每孔 50 μ L,立即补加细胞生长液 50 μ L,置 37℃ 温箱内 1 h,然后每孔加入 100 μ L 细胞悬液,计算该试验中 TCID₅₀/50 μ L 的实际用量。

4 结果判定

- 4.1 将培养板放置 37℃ 温箱内培养 72 h 进行初判,120 h 进行终判。在倒置显微镜下检查细胞病变