

2001年临床医师笔试真题及答案（二）

第二单元

A1型选择题（1-80题）

答题说明

每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 心尖区触及舒张期震颤，最可能的是（答案：A）

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 室间隔缺损
- E. 动脉导管未闭

2. 双下肢对称性紫癜伴荨麻疹者常见于（答案：A）

- A. 过敏性紫癜
- B. 再生障碍性贫血
- C. 激素性紫癜
- D. 血小板减少
- E. 特发性血小板增多症

3. 诊断幽门梗阻最有价值的体征是（答案：A）

- A. 振水音阳性
- B. 肠鸣音亢进
- C. 上腹部膨隆
- D. 明显脱水
- E. 上腹部固定压痛

4. 高度脾肿大可见于（答案：D）

- A. 结缔组织病
- B. 急性白血病
- C. 慢性溶血性贫血
- D. 慢性粒细胞白血病
- E. 骨髓增生异常综合征

5. 引起左心室后负荷增高的主要因素是（答案：B）

- A. 肺循环高压
- B. 体循环高压
- C. 回心血量增加
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 血细胞比容增大

6. 急性心肌梗死时，特异性最高的血清标志物是（答案：D）

- A. LDH

B.  $\alpha$ -HBDH

C. SGOT

D. TnI

E. CPK

7. 不是由于容量负荷过重所致心力衰竭的疾病是（答案：B）

A. 主动脉瓣关闭不全

B. 甲状腺功能亢进症

C. 二尖瓣关闭不全

D. 室间隔缺损

E. 动静脉瘘

8. 洋地黄中毒所致的室性心动过速忌用（答案：E）

A. 利多卡因

B. 普罗帕酮

C. 苯妥英钠

D. 氯化钾

E. 直流电复律

9. 下列临床表现中最不支持心绞痛诊断的是（答案：D）

A. 疼痛可在睡眠中发生

B. 含服硝酸甘油，疼痛在3-5分钟内缓解

- C. 疼痛易被运动或情绪激动诱发
- D. 反复出现的局限性心前区刺痛，每次持续仅2-3秒
- E. 疼痛在休息时发生，持续1-10分钟

10. 女，40岁，反复胸闷、心悸4月入院，体检发现心脏杂音，心脏M型超声心动图检查见图1，最可能的诊断是（答案：A）

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 二尖瓣脱垂
- D. 正常二尖瓣
- E. 二尖瓣碟瓣

11. 扩张型心肌病最主要的临床表现为（答案：A）

- A. 充血性心力衰竭
- B. 猝死
- C. 栓塞
- D. 食欲不振
- E. 肺部感染

12. 下列不属于心包穿刺的指征是（答案：B）

- A. 心脏压塞
- B. 为证实心包积液的存在
- C. 为明确心包积液的性质

D. 心包积液

E. 心包内药物治疗

13. 心绞痛与急性心肌梗死临床表现的主要鉴别点是（答案：E）

A. 疼痛部位

B. 疼痛性质

C. 疼痛程度

D. 疼痛放射部位

E. 疼痛持续时间

14. 右心衰竭体循环瘀血的表现是（答案：E）

A. 端坐呼吸

B. 心源性哮喘

C. 劳力性呼吸困难

D. 阵发性夜间呼吸困难

E. 肝颈返流征阳性

15. 下列哪种脉搏提示主动脉瓣关闭不全（答案：C）

A. 交替脉

B. 奇脉

C. 水冲脉

D. 短绌脉

E. 脱落脉

16. 心肌坏死的心电图特征性表现是（答案：B）

A. ST段水平型下降

B. 病理性Q波

C. T波低平

D. 冠状T波

E. ST段抬高呈弓背向上型

17. 室性心动过速心电图诊断的最主要依据是（答案：D）

A. QRS波群形态宽大畸形

B. 心室率100-200次/分

C. 心室律稍微不规则

D. 心室夺获和室性融合波

E. 房室分离，房率>室率

18. 心尖区收缩中期附加音并有收缩中晚期杂音者最可能的诊断为（答案：C）

A. 冠心病劳力型心绞痛

B. 风心病二尖瓣关闭不全

C. 二尖瓣脱垂

D. 扩张型心肌病

E. 乳头肌功能不全

19. 风心病患者，突发呼吸困难，咳粉红色泡沫痰，血压120 / 80mmHg，心率140次 / 分，心律绝对不齐。首选药物是（答案：C）

- A. 普罗帕酮（心律平）
- B. 利多卡因
- C. 毛花甙丙（西地兰）
- D. 可拉明
- E. 胺碘酮

20. 陈旧性心肌梗死患者，心电图示频发室性期前收缩。首选药物是（答案：D）

- A. 慢心律
- B. 普罗帕酮（心律平）
- C. 奎尼丁
- D.  $\beta$ 受体阻滞剂
- E. 钙拮抗剂

21. 老年患者突然发生寒颤、高热、咳嗽、咳痰，痰呈砖红色胶冻状，引起肺部感染最可能的病原菌是（答案：B）

- A. 葡萄球菌
- B. 克雷白杆菌
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 流感嗜血杆菌
- E. 嗜肺军团杆菌

22. 符合肺结核活动期特点的是 (答案: E)

- A. 痰涂片找到抗酸杆菌
- B. X线胸片病灶扩大
- C. 病灶边缘模糊
- D. 空洞形成
- E. 病灶密度高, 边界清楚

23. 慢性肺心病引起肺动脉高压最主要的原因是 (答案: E)

- A. 血液粘稠度增加
- B. 血容量增加
- C. 慢性炎症所致的肺动脉狭窄
- D. 高碳酸血症
- E. 缺氧性肺血管收缩

24. II型呼吸衰竭的血气诊断标准是 (答案: C)

- A.  $PaO_2 < 50\text{mmHg}$ ,  $PaCO_2 > 45\text{mmHg}$
- B.  $PaO_2 < 50\text{mmHg}$ ,  $PaCO_2 > 60\text{mmHg}$
- C.  $PaO_2 < 60\text{mmHg}$ ,  $PaCO_2 > 50\text{mmHg}$
- D.  $PaO_2 < 40\text{mmHg}$ ,  $PaCO_2 > 40\text{mmHg}$
- E.  $PaO_2 < 70\text{mmHg}$ ,  $PaCO_2 > 55\text{mmHg}$



25. 成人呼吸窘迫综合征 (ARDS) 的最重要的诊断依据是 (答案: C)

- A. 呼吸频率增加, 每分钟大于28次
- B. 肺泡气-动脉血氧分压差 (PA-aD02) 降低
- C. 氧合指数 (PaO<sub>2</sub> / FiO<sub>2</sub>) <300
- D. 肺内分流量减少
- E. 血气分析显示为低氧伴轻度二氧化碳潴留

26. 肺炎链球菌肺炎消散后肺组织结构的变化是 (答案: B)

- A. 肺泡壁纤维化
- B. 恢复正常
- C. 细支气管狭窄
- D. 支气管扩张
- E. 肺大泡形成

27. 肺炎链球菌肺炎治疗的首选抗生素是 (答案: D)

- A. 红霉素
- B. 庆大霉素
- C. 氧氟沙星
- D. 苯星青霉素
- E. 林可霉素

28. 血源性肺脓肿最常见的病原菌是 (答案: D)

- A. 溶血链球菌
- B. 厌氧菌
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 流感嗜血杆菌

29. 在整个病变过程中没有肺泡壁和其他结构损坏的肺炎是（答案：E）

- A. 克雷白杆菌肺炎
- B. 金黄色葡萄球菌肺炎
- C. 干酪性肺炎
- D. 绿脓杆菌肺炎
- E. 肺炎链球菌肺炎

30. 消除支气管哮喘气道炎症最有效的药物是（答案：A）

- A. 糖皮质激素
- B. 抗生素
- C. 抗组织胺药
- D.  $\beta_2$ 受体激动剂
- E. 色甘酸钠

31. 慢性支气管炎发展成阻塞性肺气肿的过程中最先发生的病理改变是（答案：B）

- A. 肺泡膨胀

- B. 细支气管不完全阻塞
- C. 肺泡壁弹性减退
- D. 肺小动脉痉挛
- E. 肺纤维化

32. 属抑菌作用的抗结核药物是（答案：D）

- A. 异烟肼（INH）
- B. 利福平（RFP）
- C. 链霉素（SM）
- D. 乙胺丁醇（EMB）
- E. 吡嗪酰胺（PZA）

33. 下列各项中不能作为幽门梗阻诊断依据的是（答案E：）

- A. 上腹部胀痛
- B. 呕吐大量宿食
- C. 胃型和蠕动波
- D. 空腹振水音
- E. 代谢性酸中毒

34. 肠结核最好发的部位是（答案：E）

- A. 直肠、乙状结肠
- B. 降结肠

- C. 横结肠
- D. 升结肠
- E. 回盲部

35. 慢性萎缩性胃炎的病理改变中属癌前病变的是（答案：B）

- A. 明显肠上皮化生
- B. 中度以上不典型增生
- C. 胃小凹上皮增生
- D. 假幽门腺化生
- E. 假幽门腺化生伴肠上皮化生

36. 诊断消化性溃疡穿孔最有价值的临床表现是（答案：E）

- A. 突发上腹部剧痛
- D. 腹式呼吸消失
- C. 上腹部压痛明显
- D. 上腹部有反跳痛
- E. 肝浊音界消失

37. 反映肝纤维化的血清学指标是（答案：D）

- A. 胆固醇
- B. 乳酸脱氢酶（LDH）
- C.  $\gamma$ -谷氨酰转肽酶（ $\gamma$ -GT, GGT）

D. 透明质酸 (HA)

E. 胆汁酸

38. 对原发性肝癌早期诊断最有价值的是 (答案: A)

A. 甲胎蛋白测定

B. 癌胚抗原测定

CB超检查

nCT检查

E. 腹部平片

39. 肝性脑病前驱期的主要表现是 (答案: A)

A. 性格改变

B. 计算能力减退

C. 定向力减退

D. 巴宾斯基 (Babinski) 征阳性

E. 生理反射亢进

40. 下列有关急性胰腺炎的各项检查中, 最早出现异常的是 (答案: C)

A. 血清脂肪酶

B. 血清正铁血白蛋白

C. 血清淀粉酶

D. 尿淀粉酶

E. 血清乳酸脱氢酶

41. 慢性肝病患者，血氨升高导致肝性脑病发生的机制，是干扰了大脑的（答案：E）

A. 蛋白质代谢

B. 脂肪代谢

C. 微量元素代谢

D. 水盐代谢

E. 能量代谢

42. 对肝硬化有确诊价值的是（答案：D）

A. 肝肿大质地偏硬

B. 脾肿大

C.  $\alpha$ -球蛋白升高

D. 肝穿刺活检有假小叶形成

E. 食道吞钡X线检查有虫蚀样充盈缺损

43. 上消化道出血最常见的病因是（答案：C）

A. 肝硬化食道静脉曲张破裂

B. 食管贲门粘膜撕裂综合征

C. 消化性溃疡

D. 胆道出血

E. 胃癌

44. 下列各项中最能支持慢性胰腺炎诊断的是 (答案: E)

- A. 反复发作上腹痛
- B. 血糖增高
- C. 粪苏丹III染色镜下有脂肪滴
- D. B超检查胰腺增大
- E. CT检查胰腺增大、有钙化影

45. 慢性肾盂肾炎的易感因素有 (答案: D)

- A. 胸膜炎
- B. 胃炎
- C. 甲状腺机能亢进
- D. 糖尿病
- E. 药物性皮炎

46. 诊断急进性肾小球肾炎最有价值的指标是 (答案: B)

- A. BUN、Scr迅速升高
- B. 50%以上肾小球囊内有大新月体形成
- C. 尿量减少但蛋白排泄量增加
- D. 血清抗中性粒细胞胞浆抗体阳性
- E. 影像学检查显示双肾增大

47. 对控制慢性肾脏病变肾功能进行性减退无明确作用的措施是（答案：D）

- A. 限制蛋白质的摄入
- B. 减少蛋白尿
- C. 控制血压
- D. 消除浮肿
- E. 纠正血脂异常

48. 鉴别上、下尿路感染的依据是（答案：B）

- A. 中段尿细菌培养
- B. 尿抗体包裹细菌检查
- C. 尿蛋白定量
- D. 3小时尿白细胞计数
- E. 尿中脓细胞检查

49. 肾性贫血最主要的原因是（答案：E）

- A. 铁及叶酸摄入不足
- B. 消化道失血
- C. 蛋白质摄入量不足
- D. 红细胞寿命缩短
- E. 红细胞生成素合成不足

50. 对诊断慢性肾盂肾炎最有意义的是（答案：E）



- A. 尿频、尿急、尿痛反复发作
- B. 清洁中段尿细菌培养计数 $>10^5$  / ml
- C. 畏寒发热，尿白细胞数增高
- D. 尿亚硝酸盐还原试验阳性
- E. 肾小管功能持续性损害

51. 关于难治性肾病综合征的治疗，不予考虑的药物

物是（答案：E）

- A. 甲泼尼龙（甲基强的松龙）
- B. 环孢素A
- C. 环磷酰胺
- D. 硫唑嘌呤
- E. 氟尿嘧啶（5-Fu）

52. 典型慢性肾功能不全时的水电解质紊乱是（答案：A）

- A. 代谢性酸中毒、低血钙、高血磷、高血钾
- B. 代谢性酸中毒、低血钙、低血磷、高血钾
- C. 代谢性酸中毒、低血钙、低血磷、高血钠
- D. 代谢性酸中毒、低血钙、低血磷、低血钠
- E. 代谢性碱中毒、低血钙、高血磷、高血钾

53. 不属于小细胞性贫血的是（答案：E）

- A. 久缺铁性贫血
- B. 海洋性贫血
- C. 慢性感染性贫血
- D. 铁粒幼细胞性贫血
- E. 再生障碍性贫血

54. 诊断温抗体型溶血性贫血最重要的实验室检查是（答案：B）

- A. Ham试验
- B. Coombs试验
- C. 红细胞渗透性脆性试验
- D. 免疫球蛋白测定
- E. 血红蛋白电泳

55. 骨髓中找到里-斯细胞，能帮助诊断的疾病是（答案：A）

- A. 霍奇金病
- B. 非霍奇金淋巴瘤
- C. 急性粒细胞白血病
- D. 急性淋巴细胞白血病
- E. 急性单核细胞白血病

56. 特发性血小板减少性紫癜较少出现（答案：A）

- A. 肌肉血肿

- B. 鼻衄
- C. 月经过多
- D. 口腔粘膜出血
- E. 皮肤瘀点

57. 慢性再生障碍性贫血患者出现酱油色尿，最特异的诊断性检查是（答案：C）

- A. 热溶血试验
- B. 蔗糖溶血试验
- C. 酸溶血试验
- D. 荧光斑点试验
- E. 抗人球蛋白试验

58. 引起继发性再生障碍性贫血最常见的病因是（答案：A）

- A. 药物及化学物质
- B. 物理因素
- C. 病毒感染
- D. 细菌感染
- E. 营养因素

59. 霍奇金病特征性的热型是（答案：D）

- A. 间歇热
- B. 稽留热

- C. 弛张热
- D. 周期性发热
- E. 不规则热

60. 诊断缺铁最肯定的依据是（答案：E）

- A. 慢性失血史
- B. 小细胞低色素性贫血
- C. 转铁蛋白饱和度降低
- D. 血清铁降低
- E. 骨髓小粒可染铁消失

61. 有功能的垂体腺瘤最常见的是（答案：D）

- A. ACTH瘤
- B. TSH瘤
- C. GH瘤
- D. PRL瘤
- E. FSH / LH瘤

62. 引起Graves病基本的原因是（答案：E）

- A. 长期碘摄入不足
- B. 长期碘摄入过多
- C. 各种因素致下丘脑分泌TRH过多

- D. 各种原因致垂体分泌TSH过多
- E. 遗传易感性和自身免疫功能异常

63. 预测Graves病停用抗甲状腺药物是否易复发的指标是（答案：E）

- A. 甲状腺摄<sup>131</sup>I率
- B. 抗甲状腺抗体
- C. TSH

nT<sub>3</sub>、T<sub>4</sub>及rT<sub>3</sub>

- E. 甲状腺刺激免疫球蛋白

64. 糖尿病病人最基础的治疗措施是（答案：A）

- A. 饮食治疗
- B. 适当体育锻炼
- C. 双胍类降血糖药
- D. 磺脲类降血糖药
- E. 胰岛素

65. 慢性淋巴性甲状腺炎引起原发性甲状腺功能减退症替代治疗的原则（答案：B）

- A. 由大剂量开始，逐渐递减到合适剂量
- B. 从小剂量开始，逐渐递增到合适剂量
- C. 甲减越严重，起始剂量应越大
- D. 间断用药有利于预防心绞痛

E. 待甲状腺功能正常后可停用

66. 以下对糖尿病检验结果的解释正确的是（答案：E）

A. 尿糖阴性可以排除糖尿病

B. 尿糖阳性可以诊断为糖尿病

C. 尿酮阳性仅见于糖尿病

D. 空腹血糖正常可以排除糖尿病

E. 餐后2小时血糖正常可以是糖尿病

67. 诊断库欣综合征最有意义的检查是（答案：D）

A. ACTH兴奋性试验

B. 甲吡酮试验

C. 赛庚啶试验

D. 地塞米松抑制试验

E. 螺内酯试验

68. 诊断甲状腺高功能腺瘤最佳的检查是（答案：B）

A. 甲状腺B超

B. 甲状腺核素扫描

C. 甲状腺CT

D. 甲状腺MRI

E. 甲状腺摄<sup>131</sup>I率

69. 外源性致热原的特点，正确的是（答案：C）

- A. 分子量较小
- B. 其致热原性可被蛋白酶类所破坏
- C. 能激活血液中的中性粒细胞和单核细胞
- D. 直接作用于体温调节中枢
- E. 在体内最终由肝、肾灭活和排泄

70. 病原体侵入人体后，临床上不（答案：C）

显示出任何症状、体征，但可产生  
特异性免疫，被称为

- A. 潜伏性感染
- B. 病原体被清除
- C. 隐性感染
- D. 显性感染
- E. 病原携带状态

71. 流行性出血热早期休克的原因是（答案：B）

- A. 过敏性
- B. 失血浆性
- C. 出血性
- D. 感染性

E. 心源性

72. 间日疟的典型发作中，不存在（答案：A）

A. 前驱期

B. 寒战期

C. 高热期

D. 大汗期

E. 间歇期

73. 脑猪囊尾蚴病的临床表现复杂多样，但最常见的临床类型是（答案：A）

A. 脑实质型

B. 脑室型

C. 软脑膜型

D. 脊髓型

E. 混合型

74. 主要用于预防疟疾的药物是（答案：A）

A. 乙胺嘧啶

B. 奎宁

C. 青蒿素

D. 伯氨喹

E. 氯喹



75. 感染性休克的常见病原体为 (答案: A)

- A. 革兰氏阴性细菌
- B. 革兰氏阳性细菌
- C. 病毒
- D. 支原体
- E. 钩端螺旋体

76. 急性细菌性痢疾病变最显著的部位是 (答案: B)

- A. 回肠末端
- B. 直肠与乙状结肠
- C. 升结肠
- D. 降结肠
- E. 整个结肠

77. 除哪项外均是霍乱患者泻吐期的临床特点 (答案: B)

- A. 多数以剧烈腹泻开始, 继以呕吐
- B. 多数腹泻伴有里急后重
- C. 大便每日数次至10数次或无法计数
- D. 粪便以黄水便或清水便为多
- E. 粪便有鱼腥味, 镜检无脓细胞

78. 以滑膜炎为基本病理改变的风湿病是（答案：B）

- A. 强直性脊柱炎
- B. 类风湿关节炎
- C. 风湿性关节炎
- D. 骨性关节炎
- E. 痛风性关节炎

79. 应用大量环磷酰胺间歇静脉冲击治疗系统性红斑狼疮的主要作用是（答案：A）

- A. 减轻心肌损害
- B. 防止肾纤维化与肾功能恶化
- C. 减轻血管炎性损害
- D. 防止中枢神经系统损害
- E. 增加血小板，防止溶血

80. 目前治疗系统性红斑狼疮的主药为（答案：E）

- A. 非甾体抗炎药
- B. 磷酸氯喹
- C. 雷公藤多甙
- D. 环磷酰胺
- E. 泼尼松

B1型选择题（81-96题）

答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(81-84题共用备选答案)

- A. 临时心脏起搏器植入
- B. 肾上腺素
- C. 直流电复律
- D. 毛花甙丙（西地兰）
- E. 阿托晶

下列各例治疗应首选

81. 男，45岁，风湿性心脏瓣膜病史20年，心房颤动5年。就诊时，心率160次/分，心房颤动，血压100 / 70mmHg（答案：D）

82. 男，65岁，急性下壁心肌梗死第2天，心电监测示二度I型房室传导阻滞，心室率50次 / 分，血压110 / 70mmHg（答案：E）

83. 男，50岁，不明原因晕厥，心电图示宽QRS波型心动过速，心室率150次/分，血压60 / 45mmHg（答案：C）

84. 女，30岁，发热3天，晕厥1次，心电图显示第三度房室传导阻滞，心室率40次 / 分（答案：A）

(85-86题共用备选答案)

- A. 支气管哮喘

- B. 喘息型慢性支气管炎
- C. 支气管肺癌
- D. 肺炎支原体肺炎
- E. 克雷白杆菌肺炎

85. 刺激性咳嗽，伴气急、痰中带血，支气管解痉药效果欠佳（答案：C）

86. 常于秋季发病，儿童和青年人多见，起病缓慢，阵发性干咳、发热、肌痛，胸片示下叶间质性肺炎改变（答案：D）

（87-88题共用备选答案）

- A. 支原体肺炎
- B. 肺炎链球菌肺炎
- C. 慢性支气管炎急性发作期
- D. 支气管哮喘
- E. 支气管扩张症

87. 病变肺部叩诊浊音，语颤增强，闻及支气管呼吸音，常见于（答案：B）

88. 发作时两肺广泛哮鸣音，缓解后哮鸣音消失，常见于（答案：D）

（89~90题共用备选答案）

- A. 空肠
- B. 末段回肠
- C. 回盲部

D. 全结肠

E. 直肠、乙状结肠

89. 溃疡性结肠炎的病变大多位于（答案：E）

90. Crohn病的病变大多位于（答案：B）

（91-92题共用备选答案）

A. 经口

B. 经血

C. 经淋巴

D. 腹腔病变直接蔓延

E. 腰椎病变直接蔓延

91. 肠结核的主要感染途径是（答案：A）

92. 结核性腹膜炎的主要感染途径是（答案：D）

（93-94题共用备选答案）

A. 卡托普利

B. 双嘧达莫（潘生丁）

C. 低分子肝素

D. 甲泼尼龙（甲基强的松龙）

E. 呋塞米（速尿）

93. 有可能引起高钾血症 (答案: A)

94. 必须监测出凝血状况 (答案: C)

(95-96题共用备选答案)

A. 环磷酰胺

B. 甲氨蝶呤

C. 长春新碱

D. 阿霉素

E. 左旋门冬酰胺酶

95. 常引起周围神经炎的化疗药是 (答案: C)

96. 常引起心脏毒性的化疗药是 (答案: D)

A2型选择题 (97-128题)

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

97. 男,25岁,持续发热10天,开始为 $38^{\circ}\text{C}$ 左右,5天后持续高热 $39-40^{\circ}\text{C}$ ,伴腹胀和轻度腹泻。体检:体温 $40^{\circ}\text{C}$ ,呼吸26次/33,脉搏86次/33,精神淡漠。两肺无异常。心率86次/分,律齐,第一心音偏低。腹胀、无压痛,肝右肋下2cm,软,脾左肋下1cm。血白细胞 $3.0 \times 10^9/\text{L}$ ,中性75%,嗜酸粒细胞0%,单核5%,淋巴20%。最可能的诊断是 (答案: B)

- A. 菌痢
- B. 伤寒、副伤寒
- C. 结缔组织病
- D. 结核病
- E. 风湿热

98. 女，30岁，寒颤、发热、腰痛伴尿频、尿急3天。体温39° C，心肺无异常。肝脾肋下未触及。两侧肋脊角有叩击痛。尿液检查：蛋白（一），镜检红细胞2-5 / HP、白细胞10-15 / HP，诊断应首先考虑（答案：B）

- A. 急性膀胱炎
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 急性肾小球肾炎
- D. 肾结核。
- E. 肾结石

99. 男，48岁，发作性胸痛一月，每次发作含硝酸甘油后缓解，考虑冠心病心绞痛。最常用的检查方法是（答案：B）

- A. 心脏X线摄片
- B. 心电图运动负荷试验
- C. 放射性核素检查
- D. 动态心电图
- E. 超声心动图

100. 女, 28岁, 发热半月, 弛张热型, 伴恶寒、关节痛。体检: 皮肤瘀点、Osler结节, 心脏有杂音, 考虑为感染性心内膜炎。确诊的直接证据来自 (答案: E)

- A. 血液学检查
- B. 心电图检查
- C. 超声心动图
- D. 免疫学检查
- E. 细菌学检查

101. 男, 45岁, 有高血压史。因阵发性心悸2天来诊, 体检: 血压120 / 70mmHg, 心率180次 / 分, 律齐, 心音正常, 无杂音。1分钟后心率降至80次份, 律齐。30秒后又回复至180次 / 分。最可能的诊断为 (答案: C)

- A. 窦性心动过速
- B. 阵发性心房颤动
- C. 阵发性室上性心动过速
- D. 阵发性心房扑动
- E. 第三度房室传导阻滞

102. 男, 42岁, 劳累时心悸、气短2年, 腹胀、尿少3天。心电图示心房颤动, 心室率110次 / 分; 胸部X线示心胸比值65%, 肺瘀血。有助于该患者诊断的辅助检查是 (答案: B)

- A. 心电向量图
- B. 超声心动图
- C. 心导管检查
- D. 心电图运动负荷试验



E. 心脏核素检查

103. 男，26岁，上肢血压180-200 / 100-110mmHg，下肢血压140 / 80mmHg，体检：肩胛间区可闻及血管杂音，伴震颤，尿17-酮，17-羟类固醇正常，尿苦杏仁酸正常。其高血压原因应考虑为继发于（答案：B）

A. 皮质醇增多症

B. 主动脉缩窄

C. 嗜铬细胞瘤

D. 原发性醛固酮增多症

E. 单侧肾动脉狭窄

104. 男，35岁，入院诊断为扩张型心肌病，心功能IV级。心电图示心率96次 / 分，心房颤动。血清钾6.5mmol / L，血清钠130mmol / L. 该患者不宜应用（答案：C）

A. 硝普钠

D. 呋塞米（速尿）

C. 螺内酯（安体舒通）

D. 地高辛

E. 阿司匹林

105. 男，32岁，3天前淋雨，次日出现寒颤、高热，继之咳嗽，咳少量粘液脓性痰，伴右侧胸痛。查体体温39° C，急性病容，口角和鼻周有疱疹。心率110次 / 分，律齐。血白细胞 $1 \times 10^9/L$ ，胸片见图2. 最可能的诊断是（答案：E）

A. 急性肺脓肿

B. 干酪性肺炎

- C. 葡萄球菌肺炎
- D. 肺炎支原体肺炎
- E. 肺炎链球菌肺炎

106. 女，60岁，慢性哮喘20年，剧烈咳嗽3天，无咳痰、咯血及发热，半小时前突发胸痛，呼吸困难，不能平卧，伴发绀。体检：血压150 / 100mmHg，呼吸40次份。右胸语颤减弱，呼吸音减低。心率110次 / 分。以上表现符合（答案：E）

- A. 肺梗死
- B. 急性心肌梗死
- C. 急性左心衰竭
- D. 阻塞性肺气肿
- E. 自发性气胸

107. 男，54岁。幼年患麻疹后反复咳嗽，迁延不愈，常咳脓痰伴咯血。近2周咳嗽加重，咳大量脓性臭痰，伴高热、气急就诊。痰涂片见革兰阳性菌和阴性菌，痰培养有需氧革兰阴性杆菌生长。感染的病原体最可能是（答案：D）

- A. 需氧革兰阴性杆菌
- B. 革兰阳性菌
- C. 厌氧菌
- D. 需氧革兰阴性杆菌+厌氧菌
- E. 革兰阴性杆菌+真菌

108. 女，35岁，肺结核患者，肺内有空洞性病变。最符合的X线表现是（答案：A）

- A. 上叶尖后段空洞，壁光滑，周围有卫星灶
- B. 下叶空洞周围大片炎性浸润
- C. 空洞内壁不规则，凹凸不平
- D. 厚壁空洞、偏心
- E. 厚壁空洞伴有液平面

109. 男，40岁，半月前开始畏寒、发热、每天体温高达39-40° C，咳嗽、咳少量脓性痰，近4天来突然咳大量臭脓痰，每日约300ml，并有痰中带血。体检右下肺叩浊，闻及支气管呼吸音，血白细胞 $20 \times 10^9$ 几，中性粒细胞0.90，最可能的诊断为（答案：C）

- A. 葡萄球菌肺炎
- B. 克雷白杆菌肺炎
- C. 急性肺脓肿
- D. 肺结核
- E. 阻塞性肺炎

110. 女，22岁，因服吲哚美辛数片后觉上腹痛，今晨呕咖啡样胃内容物400ml来诊。既往无胃病史。首选的检查是（答案：D）

- A. 血清胃泌素测定
- B. B型超声检查
- C. X线胃肠钡餐检查
- D. 急诊胃镜检查
- E. 胃液分析

111. 男, 35岁, 诊断为肝炎肝硬化失代偿期, 一周来出现轻微腹痛, 腹水增多。查体: T38.5 ° C, 腹水常规: 测黄色, 比重为1.016, 蛋白25g / L, 白细胞500X106 / L, 中性粒细胞0.85, 最可能的并发症是 (答案: C)

- A. 原发性肝癌
- B. 脾栓塞
- C. 自发性腹膜炎
- D. 门静脉血栓形成
- E. 结核性腹膜炎

112. 女, 40岁, 确诊为急性胰腺炎, 内科正规治疗2周后体温仍在38° C-39° C, 左上腹部压痛明显。尿淀粉酶256U (Winslow法), 血白细胞 $16 \times 10^9/L$ , 可能性最大的是 (答案: B)

- A. 病情迁延未愈
- B. 并发胰腺脓肿
- C. 并发胰腺假性囊肿
- D. 败血症
- E. 合并急性胆囊炎

113. 女, 36岁, 反复腹泻2年, 间有脓血便, 粪培养阴性, 多种抗生素治疗无效, 为明确诊断, 首选的检查是 (答案: D)

- A. 腹部平片
- B. X线胃肠钡餐检查
- C. 钡剂灌肠造影
- D. 结肠镜检查

E. 腹部CT

114. 男，30岁，肝区钝痛、低热、乏力3个月，有血吸虫疫水接触史，偶饮酒。查体：肝肋下2cm，质硬。HBsAg (+)，ALT60U，A / G3.1 / 3.0，AFI>先后检测二次，结果分别为200ng / ml和400ng / ml. 诊断首先应考虑（答案：E）

- A. 慢性活动性肝炎
- B. 肝炎肝硬化
- C. 血吸虫病性肝纤维化
- D. 酒精性肝硬化
- E. 肝炎肝硬化合并原发性肝癌

115. 男，28岁，反复上腹隐痛、泛酸5年。X线钡餐检查结果见图3，最可能的诊断是（答案：D）

- A. 胃体溃疡
- B. 胃角溃疡
- C. 幽门管溃疡
- D. 十二指肠溃疡
- E. 复合溃疡

116. 男，70岁，发现大量蛋白尿2周入院。入院后查本周蛋白尿阳性。为明确诊断，检查意义最大的是（答案：B）

- A. 肾活检
- B. 骨髓穿刺

- C. 核素骨扫描
- D. 全身X线骨摄片
- E. 血清蛋白电泳

117. 男, 40岁, 因大量蛋白尿, 高度浮肿, 诊断肾病综合征入院。肾穿活检病理为: 微小病变型。即予泼尼松60mg / 日口服, 症状有所控制。治疗3周后, 又出现大量蛋白尿, 双下肢浮肿加重, 肾功能减退。此时首先应考虑 (答案: B)

- A. 感染
- B. 肾静脉血栓形成
- C. 加用细胞毒药物
- D. 糖皮质激素冲击
- E. 急性肾衰竭

118. 男, 44岁, 头晕、乏力、面色苍白3年。巩膜轻度黄染, 脾肋下2cm。血红蛋白56g / L, 红细胞 $1.8 \times 10^{12} / L$ , 白细胞 $2.2 \times 10^9 / L$ , 血小板 $32 \times 10^9 / L$ 。骨髓增生减低, 但红系增生, 以中、晚幼红为主, 尿Rous试验 (+), Ham试验 (+) 首先考虑 (答案: D)

- A. 缺铁性贫血
- B. 巨幼细胞贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
- E. 自身免疫性溶血性贫血

119. 男, 46岁, 右颈部无痛性淋巴结肿大4个月, 伴上腹疼痛, 食欲不佳, 发热、盗汗、体重减轻。行剖腹探查见胃与胰头及腹膜有粘连, 周围有多个肿大的淋巴结, 病理检查为非霍

奇金淋巴瘤，T细胞来源。临床分期属（答案：E）

- A. IIB
- B. mA
- C. mB
- D. 1VA
- E. IVB

120. 男，40岁，患糖尿病10余年，尿蛋白阴性，近1个月感下腹部胀，排尿不畅伴尿失禁。B  
超声显示膀胱扩大，尿潴留。其原因应考虑（答案：A）

- A. 糖尿病自主（植物）神经病变
- B. 糖尿病合并泌尿系感染
- C. 糖尿病合并慢性前列腺炎
- D. 糖尿病肾病
- E. 糖尿病合并泌尿系结石

121. 女，38岁，10年前分娩后出现无乳，闭经，食欲减退，怕冷，面色苍白，毛发脱落。最  
可能的诊断是（答案：A）

- A. 腺垂体功能减退症
- B. 原发性甲状腺功能减退症
- C. 神经性厌食症
- D. 肾上腺皮质功能减退症
- E. 卵巢功能早衰症

122. 女, 45岁, 轻度肥胖, 无明显口渴、多饮和多尿现象, 空腹血糖6.8mmol / L. 为确定是否有糖尿病, 应检查 (答案: C)

- A. 糖基化血红蛋白
- B. 24小时尿糖定量
- C. 口服葡萄糖耐量试验
- D. 复查空腹血糖
- E. 餐后2小时血糖

123. 男, 42岁, 2年前诊断为原发性慢性肾上腺皮质功能减退症, 长期口服氢化可的松 (30mg / 日) 替代治疗。近2天发热38° C, 咽痛。目前氢化可的松应 (答案: E)

- A. 改用等效量的地塞米松
- B. 因有感染而暂时停用
- C. 剂量减少1 / 2
- D. 剂量维持不变
- E. 剂量增加为2倍-3倍

124. 男, 28岁, 突起寒颤, 高热, 恶心, 呕吐、腰痛已5天。体检: 重病容, 眼睑浮肿, 球结膜及胸部皮肤充血, 腋下见少许点状出血点, 血压70 / 50mmHg, 怀疑流行性出血热。本例必须首先考虑的治疗措施是 (答案: B)

- A. 丸用升压药
- B. 补充血容量
- C. 纠正酸中毒
- D. 小剂量肝素抗DIC



E. 选用抗病毒治疗

125. 9岁，学生，1月底因突起高热、剧烈头痛、恶心伴非喷射性呕吐1次入院。体检：神清，全身皮肤散在瘀点、瘀斑，颈项抵抗，心率120次/分，两肺无异常，腹软无压痛。化验检查：血白细胞计数 $20 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.89，淋巴细胞0.05，单核细胞0.06最可能的诊断是（答案：B）

- A. 伤寒
- B. 流行性脑脊髓膜炎
- C. 结核性脑膜炎
- D. 流行性乙型脑炎
- E. 病毒性脑炎

126. 男，20岁，在一次体检中发现HBsAg阳性，当时无自觉症状及体征，肝功能正常。次年5月，因突然乏力、恶心、厌食、尿黄而入院。化验：ALT500u，血清总胆红素 $85 \mu\text{mol/L}$ ，抗-HAVIgM (+)。该患者的诊断可能为（答案：C）

- A. 乙型肝炎，慢性迁延型，既往感染过甲型肝炎
- B. 乙型肝炎，慢性活动型，既往感染过甲型肝炎
- C. 急性甲型黄疸型肝炎，乙型肝炎病毒携带者
- D. 急性乙型肝炎，合并甲型肝炎
- E. 急性黄疸型肝炎，甲、乙型肝炎病毒混合感染

127. 23岁，农民，因发热、头痛、全身酸痛、软弱无力一周于9月4日入院。当天起出现心慌、气促、体温 $39.6^\circ\text{C}$ 。体检：面色苍白，腓肠肌压痛，心率124次/分，呼吸36次/分。肺部散在湿性啰音。血象：血白细胞计数 $9.0 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.76，淋巴细胞0.24。X线摄片

示：两肺纹理增多，有散在性点状阴影。本病例最可能的诊断是（答案：D）

- A. 粟粒性肺结核
- B. 支气管肺炎
- C. 流行性出血热
- D. 钩端螺旋体病
- E. 急性血吸虫病

128. 女，18岁。发热一月，近一周来两面颊出现对称性红斑、手指关节红肿，化验：血红蛋白90g/L，白细胞 $3.0 \times 10^9$ /L，尿蛋白+++，抗ds-DNA抗体阳性，应首先考虑诊断（答案：D）

- A. 缺铁性贫血
- B. 慢性肾炎
- C. 类风湿关节炎
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 风湿热

A/A4型选择题（129-160题）

答题说明

以下提供若干个案例每个案例下设若干道考题。请根据案例所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

（129-130题共用题干）

男，X岁，受凉后咳嗽，咳少量粘液脓痰，伴发热，右侧胸痛并右肩及右上腹痛；查体：体温 $39.1^{\circ}\text{C}$ ，脉搏96次/分，呼吸24次/分；右侧胸廓呼吸动度减弱，语颤增强，右肺下叩诊浊音，可听到支气管呼吸音并响亮的中等湿啰音；血常规化验：白细胞 $15 \times 10^9$ ，中性0.90129. 对该患者诊断最有意义的检查是：（答案：E）

- A. 痰培养加药敏试验
- B. 心电图检查
- C. 腹部超声波检查
- D. 血沉、肝功检查
- E. 胸部X线正侧位摄片

130. 该患者的中等湿啰音产生原理是（答案：A）

- A. 气体通过气管、支气管内的液体，形成水泡随即破裂而产生的声音
- B. 气体通过狭窄的气管、支气管腔产生震动引起的声音
- C. 炎症侵入胸膜，引起脏、壁层胸膜粗糙、摩擦而产生的声音
- D. 是肺部炎症时，实变部分传音良好，支气管呼吸音经肺实变部分传到胸壁的声音
- E. 是病人无力排痰，气体通过分泌物积聚的大气道所产生的声音

（131~133题共用题干）

男，68岁，2周来反复胸痛，发作与劳累及情绪有关，休息可以缓解。3小时前出现持续性疼痛，进行性加剧，并气促，不能平卧，血压110 / 70mmHg，心率120次份，律齐，心尖部可闻及3 / 6级收缩期杂音，双肺散在哮鸣音及湿性啰音

131. 根据上述临床表现，该病人的诊断最可能是（答案：E）

- A. 风心病二尖瓣关闭不全
- B. 扩张型心肌病
- C. 支气管哮喘
- D. 支气管肺炎
- E. 急性心肌梗死并发左心衰竭

132. 首选检查为（答案：B）

- A. X线胸片
- B. 心电图
- C. 超声心动图
- D. 血清心肌酶
- E. 心肌核素扫描

133. 首选治疗方案应为（答案：E）

- A.  $\beta$ -受体阻滞剂预防室性心律失常
- B. 抗生素控制感染
- C. 洋地黄类药物
- D. 肾上腺皮质激素减轻支气管痉挛
- E. 吗啡和利尿剂

（134-136题共用题干）

男，44岁，因发热、胸痛伴心包摩擦音，曾用非激素类抗炎药。2周后，呼吸困难加重，心率110次/分，律齐，心音遥远，血压90/70mmHg. 肝脏肿大，下肢浮肿。

134. 患者近2周出现的病情变化，提示（答案：B）

- A. 肾功能不全
- B. 心脏压塞
- C. 右心功能不全
- D. 肝硬化

E. 粘液性水肿

135. 病人还存在具有诊断价值的体征是（答案：C）

A. 水冲脉

B. 交替脉

C. 奇脉

D. 重搏脉

E. 短绌脉

136. 首选的治疗措施是（答案：D）

A. 毛花甙丙（西地兰）

B. 呋塞米（速尿）

C. 抗生素

D. 心包穿刺

E. 体外反搏

（137-139题共用题干）

男，51岁，重症肺炎患者，入院后次日病情加重，突发持续性呼吸急促，发绀，伴烦躁，呼吸频率38次/分，心率108次/分，律齐，两肺可闻及湿啰音。血气分析：pH7.34 PaO<sub>2</sub>50mmHg, PaCO<sub>2</sub>30mmHg. 胸片示两中下肺纹理增多模糊，斑片状阴影，心胸比例正常。

137. 最可能的诊断是（答案：E）

A. 肺梗死

B. 急性左心衰竭

- C. 自发性气胸
- D. 肺不张
- E. 成人呼吸窘迫综合征 (ARDS)

138. 为缓解病人的呼吸困难, 最好采用 (答案: C)

- A. 高频通气
- B. 持续气道正压通气 (CAPA)
- C. 呼气末正压通气 (PEEP)
- D. 高浓度吸氧
- E. 双气道正压通气 (Bi-PAP)

139. 对输液的要求是 (答案: D)

- A. 入量>出量 (>500ml)
- B. 入量>出量 (>600ml-1000ml)
- C. 入量=出量
- D. 入量<出量 (<500ml-1000ml)
- E. 不限制胶体溶液

(140-141题共用题干)

女, 30岁。反复发作性呼吸困难、胸闷2年, 3天前受凉后咳嗽, 咳少量脓痰, 接着出现呼吸困难、胸闷, 并逐渐加重。体检: 无发绀, 双肺广泛哮鸣音, 肺底部有湿啰音

140. 最可能的诊断为 (答案: B)

- A. 外源性支气管哮喘

- B. 内源性支气管哮喘
- C. 慢性喘息性支气管炎
- D. 慢性阻塞性肺疾病 (COPD)
- E. 心源性哮喘

141. 表明气道阻塞具有可逆性的是 (答案: C)

- A. 一秒钟用力呼气容积 (FEV1) <60%
- B. 最大呼气流量 (PEF) <60%
- C. 吸入沙丁胺醇后FEV: 增加率>15%
- D. 吸入二丙酸倍氯米松后FEV1增加率>15%
- E. 支气管激发试验阳性

(142-143题共用题干)

男, 22岁, 因呕吐咖啡色液体及黑便来诊。既往无胃病及肝病。查体: 面色稍苍白, 血压100 / 60mmHg, 心率92次 / 分, 腹软, 肝脾未触及, 肠鸣音活跃。

142. 最可能的诊断是 (答案: B)

- A. 食管静脉曲张破裂出血
- B. 十二指肠溃疡并发出血
- C. 胃癌出血
- D. 卓-艾 (Zollinger-Ellison) 综合征并发出血
- E. 食管贲门撕裂综合征

143. 药物治疗首选 (答案: A)

- A. 质子泵阻滞剂
- B. 硫糖铝
- C. 生长抑素制剂
- D. 胶体次枸橼酸铋
- E. 米索前列醇

(144-145题共用题干)

女，42岁，参加宴会后突发中上腹持续性疼痛伴恶心、呕吐8小时来诊，既往无胃病史。查体：T38°C，巩膜无黄染，上腹偏左有压痛及轻度肌紧张，肝浊音界正常，Murphy征阴性，肠鸣音正常。

144. 最可能的诊断是 (答案: D)

- A. 急性肠梗阻
- B. 急性阑尾炎
- C. 急性胆囊炎
- D. 急性胰腺炎
- E. 消化性溃疡穿孔

145. 为明确诊断，首选的检查是 (答案: B)

- A. 尿淀粉酶
- B. 血淀粉酶
- C. 血脂肪酶
- D. 腹部超声
- E. 腹部平片



(146-148题共用题干)

男，30岁。咽疼、咳嗽、发热，2周后发现尿色红，眼睑浮肿，尿量1000ml / 24h。体检：全身皮肤未见皮疹，血压150 / 100mmHg。化验：尿蛋白++，红细胞50-60 / HP，血白蛋白32S/L，血肌酐123  $\mu$ mol / L。

146. 上述临床表现最可能的诊断是 (答案：A)

- A. 急性链球菌感染后肾炎
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 过敏性紫癜
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 急性肾小管坏死

147. 该患者的治疗，下列不妥的是 (答案：E)

- A. 控制血压
- D. 消肿
- C. 低盐饮食
- D. 抗生素
- E. 补充白蛋白

148. 按上述治疗2个月后，病情无好转，血肌酐300， $1\text{mol} / \text{L}$ ，对诊断最有价值的进一步检查是 (答案：B)

- A. 清洁中段尿培养
- B. 肾穿刺活检

- C. 肾脏ECT
- D. 肾脏B型超声
- E. 静脉肾盂造影

(149-151题共用题干)

男，20岁，苍白、乏力一周。淋巴结及脾大，白细胞计数 $32.0 \times 10^9/L$ ，骨髓中原始细胞占83%，过氧化物酶染色阴性。

149. 最可能的诊断是 (答案: E)

- A. 急性早幼粒细胞白血病
- B. 急性粒细胞白血病
- C. 急性红白血病
- D. 急性单核细胞白血病
- E. 急性淋巴细胞白血病

150. 最适宜的化疗方案是 (答案: D)

- A. DA方案
- B. HA方案
- C. HOAP方案
- D. VDP方案
- E. CHOP方案

151. 如果出现头痛，时有呕吐，脑脊液压力增高，脑脊液可见少量幼稚细胞，应加用的治疗是 (答案: E)

- A. 脾切除术
- B. 输血小板悬液
- C. 控制感染
- D. 白细胞去除术
- E. 鞘内注射甲氨蝶呤

(152-154题共用题干)

男，70岁，软弱无力，进食减少，口渴、多尿2周，近2天嗜睡。急诊检查：BP70 / 50mmHg，神志朦胧，皮肤干燥失水，呼吸34次 / 分，心率108次 / 分，尿糖（++++），尿酮（±）。既往无糖尿病史。

152. 最可能的诊断是（答案：E）

- A. 糖尿病肾病
- B. 糖尿病性神经病变
- C. 糖尿病酮症酸中毒
- D. 糖尿病乳酸性酸中毒
- E. 高渗性非酮症糖尿病昏迷

153. 为明确诊断，除血糖测定外，首选的检查是（答案：A）

- A. 血电解质+BUN、Cr
- B. 糖基化血红蛋白+BUN、Cr
- C. 血气分析+BUN、Cr
- D. 血酮体+血气分析
- E. 血乳酸+血气分析

154. 最主要的治疗措施是（答案：D）

- A. 抗感染
- B. 肾上腺皮质激素
- C. 口服降血糖药
- D. 小剂量胰岛素及补液
- E. 补充碱性药物

（155-156题共用题干）

男性，30岁，发热10天，高达39.6℃，伴头痛，无咳嗽，无呕吐、腹泻，曾按感冒治疗，无好转。体检：贫血貌，表情淡漠，脉搏64次/分，Jb肺未见异常，肝肋下未及，脾肋下刚触及。血白细胞计数 $3.2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.67，淋巴细胞0.33，胸片未见异常。

155. 最可能的诊断是（答案：D）

- A. 系统性红斑狼疮
- B. 淋巴瘤
- C. 恶性组织细胞病
- D. 伤寒
- E. 败血症

156. 对上述病例，首选治疗药物是（答案：C）

- A. 青霉素
- D. 利福平
- C. 喹诺酮类药物

D. 头孢菌素类药物

E. 磺胺类药物

(157-158题共用题干)

男性，30岁，农民。既往体健。7月2日来诊，腹泻2天，为水样便带少量粘液，量多，日十余次，相继呕吐数次。无发热、无腹痛。腓肠肌痉挛。体检：体温36.8°C，神志清，皮肤弹性差，脉细速，血压70 / 30mmHg。化验检查：大便镜检白细胞0-2 / HP，血红蛋白160pL，血白细胞计数 $12 \times 10^9$  / L，中性粒细胞0.78，淋巴细胞0.12，单核细胞0.10。

157. 最可能的诊断是（答案：D）

A. 菌痢

B. 急性肠炎

C. 细菌性食物中毒

D. 霍乱

E. 轮状病毒感染

158. 本例治疗的关键环节是（答案：C）

A. 抗菌治疗

B. 抗病毒治疗

C. 补充液体和电解质

D. 低分子右旋糖酐扩容

E. 选升压药，纠正低血压

(159-160题共用题干)

女性，45岁。双手和膝关节肿痛伴晨僵1年。体检：肘部可及皮下结节，质硬，无触痛。

159. 诊断首先考虑（答案：D）

- A. 系统性硬化症
- B. 骨关节炎
- C. 痛风
- D. 类风湿关节炎
- E. 风湿性关节炎

160. 最有助于确定诊断的是（答案：A）

- A. 关节影像检查
- B. 滑液检查
- C. 抗核抗体
- D. ESR
- E. CRP

A1型选择题（1-80题）

答题说明

每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 面颊部有短暂的反复发作的剧痛，检查时除触发点外无阳性体征，常见于（答案：B）

- A. 特发性

性面神经麻痹

B. 三叉神经痛

C. 症状性癫痫

D. 面肌抽搐

E. 典型偏头痛

2. 全身强直-阵挛性发作和失神发作合并发生时，药物治疗首选（答案：E）

A. 地西洋（安定）

B. 乙琥胺

C. 苯妥英钠

D. 苯巴比妥

E. 丙戊酸钠

3. 偏头痛的预防治疗药物是（答案：C）

A. 咖啡因麦角胺

B. 英明格

C. 苯噻啶

D. 小剂量阿司匹林

E. 消炎痛

4. 短暂性脑缺血发作（TIA），出现相应的症状及体征，完全恢复最长应在（答案：C）

A. 6小时内

- B. 12小时内
- C. 24小时内
- D. 48小时内
- E. 72小时内

5. 腰穿的禁忌证 (答案: D)

- A. 脑动脉硬化
- B. 神经系统变性病
- C. 急性脊髓炎
- D. 后颅窝占位病变
- E. 神经系统炎症

6. 当某一感官处于功能状态时, 另一感官出现幻觉, 此现象是 (答案: D)

- A. 功能性幻觉
- B. 内脏性幻觉
- C. 假性幻觉
- D. 反射性幻觉
- E. 原始性幻觉

7. 急性脑病综合征常见于 (答案: D)

- A. 精神分裂症
- B. 抑郁症



C. 精神发育迟滞

D. 监护病房中的垂危病人

E. 心身疾病

8. 精神分裂症的临床症状一般没有（答案：A）

A. 意识障碍

B. 情感障碍

C. 感知障碍

D. 思维障碍

E. 行为障碍

9. 谵妄状态的主要特征为（答案：A）

A. 意识障碍，且昼轻夜重

B. 幻觉

C. 记忆减退

D. 错觉

E. 注意涣散

10. 药物依赖是指个体对药物产生（答案：D）

A. 精神依赖

B. 躯体依赖

C. 耐受性增加

- D. 精神和躯体依赖
- E. 耐受性降低

11. 属于情感活动减退的症状是（答案：B）

- A. 焦虑
- B. 情感淡漠
- C. 情感倒错
- D. 情感低落
- E. 情感脆弱

12. 关于心身疾病，下列的提法中错误的是（答案：B）

- A. 属于心理生理障碍
- B. 心理治疗以森田疗法最为合适
- C. 主要累及受自主神经支配的系统或器官
- D. 由情绪因素引起，以躯体症状为主要表现
- E. 症状的波动与心理因素特别是情绪因素密切相关

13. 关于抑郁发作的诊断标准，正确的是（答案：D）

- A. 病程应持续3月以上
- B. 自责、内疚、但不能达到妄想程度
- C. 特征性睡眠障碍为人睡困难
- D. 可出现精神运动性激越

E. 严重者可出现思维贫乏

14. 低钾性碱中毒常出现于（答案：B）

A. 尿毒症

B. 胃肠减压

C. 术后少尿

D. 挤压创伤

E. 输血过量

15. 临床上最常见的输血反应是（答案：A）

A. 非溶血性发热反应

B. 变态反应

C. 过敏反应

D. 溶血反应

E. 细菌污染反应

16. 低钾血症的病人，补钾后病情仍无改善时，应首先考虑缺乏（答案：A）

A. 镁

B. 磷

C. 钠

D. 氯

E. 钙

17. 等渗性缺水的临床表现为 (答案: B)

- A. 短期内体液的丧失达体重3%时有休克
- B. 休克常伴有代谢性酸中毒
- C. 明显口渴
- D. 化验检查见血清Na<sup>+</sup>降低
- E. 化验检查见尿比重在1.010以下

18. 输血引起的急性溶血的特异性表现 (答案: B)

- A. 尿呈深黄色, 尿胆原阳性
- B. 尿呈酱油色, 尿胆原阳性
- C. 尿呈深黄色, 尿胆原阴性
- D. 尿呈酱油色, 尿胆原阴性
- E. 外周血网织红细胞增高并出现幼稚红细胞

19. 治疗感染性休克时, 纠正血容量不足的最适宜输液方案是 (答案: A)

- A. 以平衡盐溶液为主, 配合适量血浆或全血
- B. 以胶体溶液 (如代血浆) 为主
- C. 以等渗生理盐水和代血浆为主
- D. 以等渗葡萄糖溶液和代血浆为主
- E. 以全血配合等渗葡萄糖溶液

20. 重症糖尿病患者施行择期手术前，血糖和尿糖应控制在（答案：A）

- A. 血糖5.6-11.2mmol / L，尿糖+~++
- B. 血糖5.6mmol / L以下，尿糖阴性
- C. 血糖11.2mmol / L以下，尿糖阴性
- D. 血糖小于5.6mmol / L，尿糖+
- E. 血糖大于11.2mmol / L，尿糖+

21. 择期胃手术一周后腹胀，肠鸣音减弱或无，反复呕吐，首先应采取（答案：B）

- A. 作胃镜检查，查明原因
- B. 胃肠减压、支持治疗
- C. 剖腹检查，解除梗阻
- D. 输液、补钾
- E. 肌注阿托品

22. 机体对创伤或感染代谢反应不同于禁食代谢反应的主要特点是（答案：B）

- A. 机体能量消耗减少
- B. 处理葡萄糖的能力降低
- C. 体内蛋白质分解减慢
- D. 尿氮减少
- E. 脂肪动用减慢

23. 长期全胃肠外营养治疗一般采用的置管途径是（答案：D）

- A. 股静脉
- B. 大隐静脉
- C. 贵要静脉
- D. 锁骨下静脉
- E. 小隐静脉

24. 不符合电烧伤特点的是（答案：E）

- A. 皮肤的损伤轻微，而全身性损伤较重
- B. 主要损害心脏，引起血液动力学改变
- C. 可发生电休克，甚至心跳呼吸骤停
- D. 有人口和出口，均为三度烧伤
- E. 深部损伤范围不超过皮肤人口处

25. 恶性程度最高的体表肿瘤是（答案：C）

- A. 皮肤乳头状癌
- B. 皮肤鳞状细胞癌
- C. 恶性黑色素瘤
- D. 纤维肉瘤
- E. 皮肤基底细胞癌

26. 雌激素受体阳性的乳癌在根治术后最常用的激素治疗方法是（答案：B）

- A. 卵巢切除

- B. 口服三苯氧胺
- C. 口服甲地孕酮
- D. 肌注丙酸睾酮
- E. 口服泼尼松

27. 低钾血症时，最早出现的临床表现是（答案：B）

- A. 心电图改变
- B. 肌乏力
- C. 口苦、恶心
- D. 心脏传导阻滞
- E. 心脏节律异常

28. 外科病人最易发生水和钠代谢紊乱是（答案：C）

- A. 原发性缺水
- B. 低渗性缺水
- C. 等渗性缺水
- D. 高渗性缺水
- E. 水过多

29. 仅用等渗盐水纠正等渗性缺水时，可导致（答案：B）

- A. 高钠血症
- B. 高氯血症

- C. 水过多
- D. 代谢性碱中毒
- E. 低钙腕

30. 代谢性酸中毒在没有发展到循环衰竭程度时，首选治疗应该是（答案：E）

- A. 使用碳酸氢钠
- B. 使用乳酸钠
- C. 使用枸橼酸钾
- D. 使用三羟氨基甲基甲烷
- E. 实施病因治疗

31. 在中国，急性胰腺炎最常见的诱发因素是（答案：C）

- A. 暴饮暴食
- B. 酗酒
- C. 胆道结石病
- D. 胃肠炎
- E. 甲状旁腺功能亢进

32. 以夏科（Charcot）三联征为典型表现的疾病是（答案：C）

- A. 急性憩室炎
- D. 急性出血性胰腺炎
- C. 急性胆管炎



D. 十二指肠憩室

E. 胃溃疡

33. 瘢痕性幽门梗阻的临床表现错误的是（答案：B）

A. 呕吐量大，一次可达1000-2000ml

B. 呕吐物多为宿食，有酸臭味，含有胆汁

C. 上腹隆起，可有蠕动波

D. 可有振水音

E. 可有低钾低氯性碱中毒

34. 下列情况中，不能行胃癌根治手术的是（答案：A）

A. 子宫直肠窝转移

B. 肝十二指肠韧带内淋巴结转移

C. 脾门部淋巴结转移

D. 癌组织浸润胰尾部时

E. 癌组织浸润横结肠时

35. 急性化脓性腹膜炎的常见原因应除外（答案：C）

A. 腹腔内脏器穿孔

B. 损伤引起的腹壁或内脏破裂

C. 血源性感染

D. 手术污染

E. 吻合口瘘

36. 阑尾切除术最常见的并发症是（答案：D）

A. 出血

B. 粪瘘

C. 腹腔脓肿

D. 切口感染

E. 粘连性肠梗阻

37. 阻塞性黄疸病人不应表现为（答案：E）

A. 胆总管结石伴有发热

B. 胰头癌伴有胆囊肿大

C. 血中结合胆红素显著升高

D. 胆总管结石黄疸呈波动性

E. 尿中胆红素阴性

38. 下列情况，需要紧急胆道减压的是（答案：D）

A. 胰头癌伴阻塞性黄疸

B. 十二指肠乳头癌伴阻塞性黄疸

C. 肝内、肝外胆管结石

D. 结石在十二指肠乳头嵌顿的急性化脓性胆管炎

E. 伴随剧烈绞痛胆囊管结石嵌顿

39. 中年妇女乳头血性溢液应首先考虑（答案：A）

- A. 乳管内乳头状瘤
- B. 乳腺囊性增生症
- C. 乳腺纤维腺瘤
- D. 炎性乳癌
- E. 乳腺硬癌

40. 门静脉高压症的治疗错误的是（答案：C）

- A. 下腔静脉与门静脉吻合易造成肝性脑病
- B. 食管胃底静脉曲张非手术治疗首选三腔管压迫止血
- C. 内镜下食管静脉呈蓝色曲张需紧急手术
- D. 食管胃底静脉曲张时可行食管内窥镜硬化剂注射治疗
- E. 静脉点滴垂体后叶素治疗

41. 腹外疝易发生嵌顿的是（答案：C）

- A. 斜疝
- B. 直疝
- C. 股疝
- D. 切口疝
- E. 脐疝

42. 甲状腺功能亢进症术前准备通常不包括（答案：D）

- A. T3, T4测定
- B. 喉镜检查
- C. 控制心率
- D. 给予氢化可的松
- E. 测基础代谢率

43. 上消化道大出血最常见的病因是（答案：A）

- A. 胃十二指肠溃疡
- B. 门静脉高压症
- C. 应激性溃疡
- D. 胆道出血
- E. 胃癌

44. 关于深静脉血栓形成的叙述正确的是（答案：B）

- A. 硬膜外麻醉后较全麻后更易发生
- B. 直肠癌低位前切除术后较甲状腺癌手术后更易发生
- C. 胆囊切除术后较全髋置换术后更易发生
- D. 术后活动过早
- E. 术后镇痛药物应用过多

45. 甲状腺癌最常见的病理类型是（答案：A）

- A. 乳头状癌
- B. 滤泡状癌
- C. 乳头状癌合并滤泡状癌
- D. 髓样癌
- E. 未分化癌

46. 盲肠癌病人最少见的合并症是（答案：B）

- A. 缺铁性贫血
- B. 大肠梗阻
- C. 右下腹包块
- D. 急性阑尾炎
- E. 原因不明的低热和消瘦

47. 急性持续性腹痛，阵发性加剧并伴休克情况下，最可能是（答案：D）

- A. 输尿管结石肾绞痛
- B. 单纯性机械性肠梗阻
- C. 急性阑尾炎
- D. 绞窄性肠梗阻
- E. 胆道蛔虫病

48. 乙型肝炎后肝硬化的主要合并症不包括（答案：E）

- A. 肝癌

- B. 门静脉高压症
- C. 急性肠系膜上静脉血栓形成
- D. 肝功能衰竭
- E. 急性肝静脉血栓形成

49. 在绝大多数人中（答案：B）

- A. 胆囊管汇合于右肝管
- B. 胆囊管汇合于肝总管
- C. 胆囊管汇合于左肝管
- D. 胆囊管汇合于乏特氏壶腹部
- E. 胆囊管汇合于十二指肠球后部胆总管

50. 以下哪项解剖标志将肝脏分为大致相等的两半（答案：C）

- A. 镰状韧带
- B. 右叶间裂
- C. 正中裂
- D. 冠状韧带
- E. 左右三角韧带连线

51. 下肢静脉曲张行静脉造影显示静脉全程通畅呈直桶状，提示（答案：E）

- A. 单纯性下肢静脉曲张
- B. 动静脉瘘

- C. 交通支瓣膜功能不全
- D. 下肢深静脉血栓形成后遗症
- E. 原发性下肢深静脉瓣膜功能不全

52. 腹股沟斜疝患者疝还纳后，使肿物不再出现的压迫部位是（答案：E）

- A. 海氏三角
- B. 腹股沟韧带中点
- C. 阴囊根部
- D. 斜疝外环
- E. 腹股沟韧带中点上方1.5cm

53. 腹部闭合伤，确诊有无内脏伤最简便，最可靠的诊断方法为（答案：E）

- A. X线照片
- B. CT
- C. 白细胞计数
- D. B超
- E. 腹腔穿刺

54. 急性脓胸最常继发于（答案：A）

- A. 肺部感染
- B. 胸部开放性损伤
- C. 膈下脓肿

D. 脓毒血症

E. 胸外科手术后

55. 常见前纵隔肿瘤是（答案：A）

A. 胸腺瘤

B. 神经源性肿瘤

C. 肉瘤

D. 平滑肌瘤

E. 支气管囊肿

56. 诊断张力性气胸最充分的根据是（答案：E）

A. 呼吸困难并伴有皮下气肿

B. 伤侧胸部叩诊呈高调鼓音

C. 伤侧呼吸音消失

D. X线所见纵隔向健侧移位

E. 胸膜腔抽出高压气体

57. 中心型肺癌最常见的早期症状是（答案：E）

A. 呼吸困难

B. 胸痛

C. 声音嘶哑

D. 发热



E. 刺激性咳嗽、血痰

58. 伸直型桡骨下端骨折的畸形是（答案：B）

A. 垂腕型

B. 银叉型

C. 尺偏型

D. 爪型

E. 僵硬型

59. 骨折的专有体征是（答案：A）

A. 骨磨擦音

B. 疼痛与压痛

C. 局部肿胀

D. 功能障碍

E. 血运不良

60. 属于不稳定性骨折的是（答案：E）

A. 嵌插骨折

B. 青枝骨折

C. 横骨折

D. 裂缝骨折

E. 斜骨折

61. 直髓提高试验，正常一般至少提高到（答案：C）

- A.  $40^{\circ}$  - $49^{\circ}$
- B.  $50^{\circ}$  - $59^{\circ}$
- C.  $60^{\circ}$  - $70^{\circ}$
- D.  $80^{\circ}$  - $99^{\circ}$
- E.  $90^{\circ}$  及以上

62. 股骨头的主要血液供应来源是（答案：A）

- A. 旋股内、外侧动脉的分支
- B. 股圆韧带内的小凹动脉
- C. 股骨干的滋养动脉升支
- D. 闭孔动脉
- E. 阴部内、外动脉

63. 疑为骨盆骨折的患者来院急诊，最首要的检查应是（答案：A）

- A. X线片
- B. MRI
- C. 核素骨扫描
- D. 肛门指诊
- E. CT

64. 骨巨细胞瘤的好发年龄是（答案：E）

- a. 1-5岁
- B. 6-10岁
- C. 11-15岁
- D. 16-20岁
- E. 21-30岁

65. 腰椎间盘突出症最常见的部位是（答案：E）

- A. T12-L1
- B. L1-2
- C. L4-5
- D. L3-4
- E. L<sub>5</sub>/S<sub>1</sub>

66. 胫骨中下1/3骨折最常见的并发症是（答案：E）

- A. 血管损伤
- B. 神经损伤
- C. 损伤性骨化
- D. 骨筋膜室综合征
- E. 骨折延迟愈合

67. 髋关节后脱位的典型畸形是髋关节（答案：A）

- A. 屈曲、内收、内旋
- B. 屈曲、内收、外旋
- C. 屈曲、外展、内旋
- D. 屈曲、外展、外旋
- E. 屈曲、外旋

68. 早期诊断急性血源性骨髓炎最有价值的方法是（答案：D）

- A. X线照片
- B. CT
- C. 核素骨扫描
- D. 局部分层穿刺
- E. 血培养

69. X线图像（图1）的诊断是（答案：B）

- A. 骨软骨瘤
- B. 骨肉瘤
- C. 骨化性肌炎
- D. 骨结核
- E. 慢性骨髓炎

70. 骨与关节结核发病率最高的部位（答案：C）

- A. 肩关节

- B. 肘关节
- C. 脊柱
- D. 髋关节
- E. 膝关节

71. 骨折治疗的基本原则是（答案：D）

- A. 复位后固定，给予促进骨折愈合
- B. 手法复位，外固定，给予活血化瘀药物
- C. 切开复位，内固定，给予抗生素
- D. 复位后固定，并开始功能锻炼
- E. 复位后固定，待解除固定后开始功能锻炼

72. 确诊前列腺癌最可靠的方法是（答案：B）

- A. 直肠指检
- B. 穿刺活检
- C. MRI
- D. 核素扫描
- E. CT

73. 病理改变在肾脏，临床表现为膀胱刺激症状，此种情况可能是（答案：D）

- A. 肾肿瘤
- B. 鹿角型肾结石

C. 多囊肾

D. 泌尿系结核

E. 急性肾炎

74. 精索静脉曲张，左侧多于右侧的主要原因不是（答案：E）

A. 左侧呈直角注入左肾静脉

B. 乙状结肠压迫

C. 左肾静脉处瓣膜发育不全

D. 静脉壁的平滑肌薄弱

E. 左肾下垂

75. 单侧隐睾手术治疗应在（答案：A）

A. 2岁以前

B. 3-6岁

C. 7-10岁

D. 青春期

E. 婚后影响生育时

76. 肾结石行体外冲击波碎石主要禁忌是（答案：E）

A. 高血压

B. 糖尿病

C. 前列腺增生

- D. 结石急性发作
- E. 输尿管狭窄

77. 急性尿潴留时最常用的处理方法是（答案：E）

- A. 利尿
- B. 针灸
- C. 膀胱穿刺抽尿
- D. 膀胱造瘘
- E. 导尿

78. 在严重颅内压增高的病例中，首选降低颅内压的药物是（答案：D）

- A. 双氢克尿噻
- B. 乙酰唑胺
- C. 氨苯蝶啶
- D. 甘露醇
- E. 呋塞米（速尿）

79. 小脑幕切迹疝最有意义的临床定侧体征是（答案：C）

- A. 患侧肢体活动减少或消失
- B. 对侧腹壁反射消失
- C. 患侧瞳孔散大
- D. 对侧肢体腱反射亢进

E. 患侧下肢病理反射阳性

80. 巨大帽状腱膜下血肿处理原则（答案：D）

A. 热敷

B. 冷敷

C. 预防感染

D. 抽吸后加压包扎

E. 切开引流

B重型选择题（81-96题）

答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

（81-82题共用题干）

A. 丘脑腹外侧核

B. 脊髓后角细胞

C. 延髓薄束核与楔束核

D. 脊髓前角细胞

E. 后根神经节

81. 振动觉和位置觉传导通路的第二级神经元是（答案：C）

82. 痛觉和温度觉传导通路的第二级神经元是（答案：B）



(83-84题共用备选答案)

- A. 吩噻嗪类药物
- B. 抑制5-HT再摄取的药物
- C. 苯二氮草类药物
- D. 锂盐
- E. 卡马西平

83. 多用于精神分裂症的药物是 (答案: A)

84. 多用于抑郁症的药物是 (答案: B)

(85-88题共用备选答案)

- A. 血酸性磷酸酶升高
- B. 血。酸性糖蛋白升高
- C. 血CEA升高
- D. 血AFP升高
- E. 血VCA-IgA抗体升高

85. 胃肠癌病人 (答案: C)

86. 肺癌病人 (答案: B)

87. 肝癌病人 (答案: D)

88. 鼻咽癌病人（答案：E）

（89-90题共用备选答案）

- A. 腹膜炎出现早
- B. 腹膜炎严重，呈板状腹
- C. 腹膜炎出现较晚，但较重
- D. 腹膜炎出现较晚且较轻
- E. 无腹膜刺激征

89. 结肠破裂（答案：C）

90. 胰腺损伤（答案：D）

（91-92题共用备选答案）

- A. 血清甲状腺球蛋白升高
- B. 血清降钙素升高
- C. 血清甲状旁腺素升高
- D. 血清垂体促甲状腺激素升高
- E. 血清T3、T4升高

91. 甲状腺滤泡状癌行甲状腺切除术后复发（答案：A）

92. 甲状腺高功能腺瘤（答案：E）

(93-94题共用备选答案)

- A. 骨软骨瘤
- B. 骨巨细胞瘤
- C. 骨肉瘤
- D. 骨转移性癌
- E. 骨囊肿

93. 男, 28岁, 右膝内侧逐渐隆起伴隐痛半年。X片示: 右胫骨干骺端有一破坏区, 边缘呈膨胀性改变, 中央有肥皂泡样阴影。诊断首先考虑 (答案: B)

94. 女, 18岁, 左膝内下硬性肿块2月, 无痛。X片示: 左胫骨干骺端内侧有正常骨组织的疣状肿物, 界限清楚, 无骨膜反应, 诊断首先考虑 (答案: A)

(95-96题共用题干)

- A. 球部尿道
- B. 膜部尿道
- C. 垂部尿道
- D. 前列腺部尿道
- E. 膀胱颈部

95. 骑跨伤易伤及 (答案: A)

96. 骨盆骨折易伤及 (答案: B)

A2型选择题 (97-128题)

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

97. 一青年患者，突然出现剧烈头痛、恶心和呕吐、意识清、四肢无瘫痪、颈项有阻力。为鉴别其为蛛网膜下腔出血，还是化脓性脑膜炎，宜采用的主要方法是

- A. 血白细胞总数和分类检查（答案：E）
- B. 颅脑CT扫描
- C. 反复测量体温
- D. 抽血作细菌培养
- E. 腰椎穿刺查脑脊液

98. 女，25岁，半年前离婚。某日下班后回到家中突然出现强烈的恐惧感，有如大祸临头，同时心悸、胸闷，呼吸困难，有窒息感。全身多汗、脸红、手脚发麻、四肢颤抖。5-6分钟后逐渐平静。最可能的诊断是（答案：E）

- A. 恐怖症
- B. 精神分裂症
- C. 慢性焦虑症
- D. 心理生理障碍
- E. 惊恐发作

99. 女，26岁，半年来无原因认为同事指桑骂槐地议论她，街上行人的举动及电视内容都针对她。为之心情烦躁，不敢上班。该病人的精神症状最可能是（答案：D）

- A. 被害妄想

- B. 情感脆弱
- C. 影响妄想
- D. 关系妄想
- E. 焦虑

100. 男，25岁，一周前右足底被铁钉刺伤，未作清创处理。近日，感头痛、咬肌紧张酸胀，诊断为破伤风，其发病机制中错误的是（答案：A）

- A. 破伤风杆菌产生的内毒素引起症状
- B. 痉挛毒素是引起症状的主要毒素
- C. 溶血毒素引起组织局部坏死和心肌损害
- D. 破伤风是一种毒血症
- E. 毒素也可影响交感神经

101. 男，44岁，切伤右手中指，即刻来诊。检查神经肌腱功能正常。处理出血最简便、有效的方法是（答案：E）

- A. 以止血钳夹住血管5分钟
- B. 冷冻止血
- C. 外用止血药
- D. 以气压止血带止血
- E. 局部包扎或缝合止血

102. 男，52岁，烧伤病人，烧伤总面积35%，其中Ⅲ烧伤面积10%。该患者属于烧伤的类型是（答案：C）

- A. 轻度烧伤
- B. 中度烧伤
- C. 重度烧伤
- D. 特重烧伤
- E. 小面积烧伤

103. 男，45岁休克病人，中心静脉压4cmH<sub>2</sub>O，血压60 / 40mmHg，该病人可能

- A. 血容量严重不足（答案：A）
- B. 肾功能不全/gt;
- C. 心功能不全
- D. 肺功能不全
- E. 容量血管过度舒张

104. 男，70岁，70%烧伤第2日，收缩压：80mmHg，呼吸率34次/分，每小时平均尿量18ml，有黑色大便，血胆红素36 μmol / L，血小板40×10<sup>9</sup>几，Glasgow计分：5分，目前最恰当的诊断是（答案：E）

- A. ARDS
- B. ARF
- C. DIC
- D. ATN
- E. MSOF

105. 男，30岁，重症感染病人，每天上午10点出现寒战、高热，已连续五天。疑有败血症，

应做血培养。最佳抽血时间应在（答案：B）

- A. 出现寒战时
- B. 预计发生寒战及发热前
- C. 寒战后体温升至最高时
- D. 体温正常后1小时
- E. 体温正常后半小时

106. 男，30岁，突发上腹剧痛3小时，怀疑消化道穿孔，无休克表现，为进一步明确诊断，首选的检查方法是（答案：B）

- A. 腹腔诊断性穿刺
- B. 立位腹部X线平片
- C. CT检查
- D. B超检查
- E. X线胃肠钡餐检查

107. 女，42岁，经常于清晨或空腹后出现乏力、心慌、冷汗，重者神智不清，抽搐、昏迷。可于进食或口服、静点葡萄糖后缓解。发作时测血糖常低于 $2.5\text{mmol/L}$ 。该病人最可能的诊断是（答案：B）

- A. 胃泌素瘤
- B. 胰岛素瘤
- C. 心血管疾病
- D. 脑血管疾病
- E. 癫痫

108. 男，40岁，因剧烈腹痛2小时，急诊入院。入院时，心电图显示心房纤颤。查体，腹部平坦，较软，直肠指诊无粘液血便。下列对于确诊最有意义的检查是（答案：D）

- A. 腹部X线平片
- B. 腹部超声检查
- C. 腹部CT
- D. 腹部动脉造影
- E. 钡剂灌肠造影

109. 男，42岁，2年前出现左下肢行走10余分钟后胀痛。休息片刻缓解，再行走后疼痛又出现。无吸烟史，发病前半年左足部外伤已治愈，体格检查：左下肢皮色较苍白，左足背动脉未触及。最可能的诊断是（答案：B）

- A. 动脉粥样硬化性闭塞症
- B. 血栓闭塞性脉管炎
- C. 雷诺病
- D. 多发性大动脉炎
- E. 结节性动脉周围炎

110. 男，56岁，阵发性腹痛6天，伴呕吐2天人院，无发热，体格检查：腹膨隆，见肠型，肠鸣音亢进，有气过水声，腹部平片见图2，可能的诊断是（答案：B）

- A. 结肠梗阻
- B. 低位小肠梗阻
- C. 高位小肠梗阻



D. 坏死性小肠炎

E. 乙状结肠扭转

111. 女，22岁，颈前肿物3个月。查体：右叶甲状腺可触及一质硬结节，直径2cm。同侧颈淋巴结可及2个，质中，活动。B型超声：甲状腺右叶一低回声实性团块。为明确肿物良恶性，下列各项检查，首先应选择（答案：C）

A. 同位素扫描

B. 血清降钙素测定

C. 针吸细胞学检查

D. 颈部软组织像

E. 右侧颈淋巴结活检

112. 男，74岁，左腹股沟可复性包块10年，不能回纳8小时，以左腹股沟斜疝嵌顿急诊手术，术中见部分嵌顿小肠肠管色暗，无蠕动，行部分肠切除，此时不宜行疝修补术的理由是（答案：D）

A. 术前准备不充分

B. 术后易出现腹胀

C. 患者年龄大，伤口愈合能力低

D. 术后易继发手术野感染

E. 术后易发生上呼吸道感染

113. 女，25岁，妊娠5个月，因转移性右下腹痛2小时就诊。经检查诊断为急性阑尾炎，其治疗措施错误的是（答案：C）

A. 行阑尾切除术

- B. 围手术期加用黄体酮
- C. 手术切口应偏低
- D. 尽量不用腹腔引流
- E. 可应用广谱抗生素

114. 男, 64岁, 散步时突然自觉腹部不适, 恶心, 头晕, 出虚汗, 心率加快, 心慌, 急就诊, 查体: P118次/分; BP100/60mmHg; 心率整, 面色苍白, 腹部广泛压痛, 尤以右侧腹明显, 轻度肌紧张, 既往有肝炎后肝硬化史, 但无出血史, 亦未做进一步检查。最可能的诊断是(答案: B)

- A. 脾破裂
- B. 肝癌破裂
- C. 溃疡病穿孔
- D. 急性坏死性胰腺炎
- E. 急性化脓性胆囊炎

115. 女, 48岁, 左乳房无痛性肿物2月余。查体: 左乳外上象限有 $1.0\text{cm} \times 1.5\text{cm} \times 1.0\text{cm}$ 肿块, 无压痛, 表面不光滑, 界限不清, 活动度尚可。最确切的检查是(答案: E)

- A. CT
- B. 乳腺B超
- C. 钼靶X线检查
- D. 红外线扫描
- E. 肿物完整切除病理检查

116. 男，50岁，从1.5米高处摔下，右胸着地。体格检查：神清，呼吸34次/分，心率100次/分，血压130/75mmHg，右胸壁畸形，无伤口，出现反常呼吸，双肺呼吸音粗，无干湿啰音。身体其余部分无损伤。现场急救的最重要处理是（答案：C）

- A. 静脉输液治疗
- B. 给氧、镇静、止痛治疗
- C. 加压包扎，迅速消除反常呼吸
- D. 行气管插管、人工控制呼吸
- E. 行气管切开术

117. 男，60岁，进食梗噎，烧灼感2个月，食管钡餐造影检查见：食管下段粘膜紊乱、断裂，管壁僵硬，应该考虑（答案：B）

- A. 食管炎
- B. 食管癌
- C. 贲门失弛缓症
- D. 食管静脉曲张
- E. 食管平滑肌瘤

118. 男，59岁，近一个月来出现低热、胸痛、咳嗽、咯痰、有时痰中混有血丝。体格检查：消瘦，左锁骨上可触及一团质硬固定肿大淋巴结。胸部X线平片及胸部CT显示左上肺叶不张。最可能的临床诊断是（答案：E）

- A. 肺结核
- B. 肺炎
- C. 肺脓肿
- D. 支气管扩张

E. 支气管肺癌

119. 女，9岁，5天前突然右髋疼痛，并有高热。体温39.5° C，脉搏110次 / 分，白细胞22 ×10<sup>9</sup> / L，中性98%，血沉30mm / 第一小时末。右髋关节肿胀，不敢活动，考虑为（答案：A）

A. 急性化脓性髋关节炎

B. 急性风湿性髋关节炎

C. 类风湿性髋关节炎

D. 髋周软组织炎

E. 髋关节结核

120. 男，18岁，左下肢跛行15年，查体发现左侧马蹄内翻足畸形，胫前肌有轻度肌收缩，但不能产生关节运动，其肌力为（答案：B）

A. 0级

B. 1级

C. 2级

D. 3级

E. 5级

121. 男，16岁，右肘部摔伤2天。右肘关节肿胀，压痛明显，活动受限，内上髁处有骨擦感。对诊断有意义的首先检查是（答案：B）

A. 核素骨扫描

B. X线摄片

C. B型超声

D. CT

E. MRI-

122. 男，35岁，胫骨中1/3骨折，最容易发生的并发症是（答案：B）

A. 腘动静脉受压

B. 骨筋膜室综合征

C. 腓总神经损伤

D. 骨折延迟愈合

E. 膝关节僵硬

123. 男，35岁，外伤后腰痛伴右下肢麻木1周。查体：腰部活动受限，右小腿外侧感觉减退，疑有腰椎间盘突出症，最有诊断价值的检查方法是（答案：C）

A. X线片

B. 透视

C. CT

D. 核素骨扫描

E. 肌电图

124. 某战士参加野营拉练归来途中自觉右小腿疼痛，经休息治疗2周后无好转，拍X线片检查发现右腓骨下段横行骨折线，无移位，其骨折的主要成因是（答案：B）

A. 直接暴力

B. 积累性劳损

C. 间接暴力

D. 肌拉力

E. 骨髓炎

125. 女，20岁，近一年来时有右下腹疼痛伴膀胱刺激症状。体检：腹软、右下腹深压痛，右腰部轻叩痛。尿常规红细胞++ / HP，白细胞+ / HP。肾图检查：右侧呈梗阻型曲线，应考虑为  
(答案：E)

A. 慢性膀胱炎

B. 急性阑尾炎

C. 慢性附件炎

D. 急性肾盂肾炎

E. 右输尿管下段结石

126. 男，40岁，诊断左肾结核，膀胱容量20ml，右肾严重积水伴尿毒症，宜首先行

A. 膀胱扩大术 (答案：B)

B. 右肾造瘘术

C. 左肾切除术

D. 左肾结核病灶清除术

E. 膀胱造瘘术

127. 女，25岁，右肾结核行右肾切除抗结核治疗半年多，尿痛缓解，但尿频加重，每晚7-8次，静脉尿路造影见左肾显影尚好，仅伴轻度肾积水及膀胱挛缩，尿常规白细胞0~2 / HP，现治疗应选择 (答案：D)

A. 左肾造瘘术

- B. 继续抗结核治疗
- C. 左输尿管皮肤造瘘术
- D. 膀胱扩大术
- E. 膀胱造瘘术

128. 女, 27岁, 后仰摔倒左枕部着地, 伤后昏迷, 检查发现患者左枕部头皮血肿, 右侧瞳孔5mm, 光反射消失, 左侧瞳孔2mm, 左侧肢体偏瘫, 右侧肢体有自主动作, 正确诊断是(答案: E)

- A. 左额颞硬膜下血肿并脑疝
- B. 左额颞硬膜外血肿并脑疝
- C. 左枕头皮血肿并右额颞硬膜外血肿
- D. 左枕头皮血肿并左额颞硬膜下血肿
- E. 右额颞硬膜下血肿并脑疝

A3 / A4型选择题 (129-160题)

答题说明

以下提供若干个案例每个案例下设若干道考题。请根据案例所提供的信息, 在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(129-131题共用题干)

男, 24岁, 突然意识不清, 跌倒, 全身强直数秒钟后抽搐, 咬破舌。2分钟后抽搐停止。醒后活动正常。

129. 首先应考虑的疾病是(答案: D)

- A. 脑出血

- B. 脑血栓
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 癫痫
- E. 脑栓塞

130. 应进一步做的检查是（答案：B）

- A. 头颅X线片
- B. 脑电图
- C. 脑脊液检查
- D. 脑血管造影
- E. 经颅超声多普勒（TCD）

131. 治疗的首选药物是（答案：E）

- A. 降颅压药
- B. 溶栓治疗
- C. 止血药
- D. 扩血管药
- E. 抗癫痫药

（132-134题共用题干）

男，30岁，约一年时间孤僻、寡言，近期由于被上级批评后出现失眠，不上班并紧闭门窗，声称有人监视自己，在家中不敢谈话，说家中已被安装窃听器，公安局也要逮捕自己，不吃妻子做的饭食，认为妻子已同他人合伙在饭菜中放了毒药。因此殴打妻子。



132. 本病例最可能的诊断是（答案：B）

- A. 久精神分裂症紧张型
- B. 精神分裂症偏执型
- C. 抑郁症
- D. 反应性精神病
- E. 躁狂症

133. 药物治疗应首选（答案：B）

- A. 丙咪嗪
- B. 利培酮
- C. 氯硝西泮
- D. 碳酸锂
- E. 氯丙咪嗪

134. 除药物治疗外要注意的是（答案：C）

- A. 说服病人放弃怀疑
- B. 外出旅行、疗养
- C. 防止发生意外
- D. 更换工作单位
- E. 请上级、同事改变对病人的态度

（135-137题共用题干）

女，50岁，因患短肠综合症，予全胃肠外营养（TPN）治疗。应用一周时病人出现昏迷，但尿内无酮体。病人既往曾有空腹血糖高（11mmol / L）。

135. 此病人的诊断是（答案：A）

- A. 高渗性非酮性昏迷
- B. 肝性昏迷
- C. 导管感染败血症
- D. 糖尿病昏迷
- E. 代谢性酸中毒

136. 此病的发病机制是由于（答案：A）

- A. 内源性胰岛素分泌不足
- B. 等渗性脱水
- C. 输液导管细菌滋生
- D. 肝功能损害
- E. 肾功能损害

137. 此病的预防主要是（答案：A）

- A. 开始一周内注意葡萄糖输注的浓度、速度和与胰岛素的比例
- B. 加强保肝
- C. 加强导管护理、无菌操作
- D. 纠正水和电解质紊乱，预防酸中毒发生
- E. 保护肾功能

（138-140题共用题干）

女，38岁，已婚，右乳外上象限可触及一直径3cm包块，同侧腋窝触到肿大淋巴结，其它器官系统未见异常

138. 在询问病史时，对诊断帮助最小的是（答案：B）

- A. 家族中有乳癌病史
- B. EB病毒感染史
- C. 结婚年龄
- D. 生育史
- E. 月经史

139. 若体检结果为T2N<sub>1</sub>M<sub>0</sub>，按TNM分期法应属于（答案：C）

- A. 0期
- B. I期
- C. II期
- D. III期
- E. IV期

140. 术后病理诊断乳腺导管浸润癌伴同侧腋窝淋巴结转移，将行粒子加速器治疗，预期疗效属于（答案：B）

- A. 高度敏感
- B. 中度敏感
- C. 低度敏感
- D. 不敏感

E. 可能使病情加重

(141-142题共用题干)

男，45岁，酗酒后8小时出现中上腹疼痛，放射至两侧腰部，伴恶心、呕吐。体检腹部有压痛、肌紧张及两侧腰腹部出现蓝棕色斑，血压75 / 55mmHg，脉搏110次/分。

141. 下列检查应首先选择 (答案: D)

- A. 血、尿常规
- B. 尿淀粉酶测定
- C. 胸腹部X线平片
- D. 血清淀粉酶测定
- E. 腹部B型超声检查

142. 对诊断困难者应进一步采取 (答案: E)

- A. 剖腹探查
- B. ERCP检查
- C. 抗感染治疗下严密观察
- D. 抗休克治疗
- E. 腹腔穿刺

(143-145题共用题干)

男，30岁，餐后突发右上腹及剑突下痛，放射到右肩及后背部，二小时后疼痛剧烈，伴恶心，并吐出所进食物，仍不缓解，急诊就医。数年胃病史及胆石症历史，间有胆绞痛发作，查体：痛苦面容，体温37.2℃，呼吸28次/分，浅快，律齐。全腹胀，上腹肌紧张，压痛反跳痛(+)。移动性浊音(±)，白细胞 $12 \times 10^9/L$ ，血红蛋白125g / L，尿淀粉酶40011(温氏法正常值 $32 \mu$ )。

143. 下列初步诊断中，不可能的是（答案：E）

- A. 胃十二指肠溃疡穿孔
- D. 急性胆囊炎
- C. 急性肠梗阻
- D. 急性胰腺炎
- E. 急性胃肠炎

144. 排除该项诊断的最主要根据是（答案：C）

- A. 患者有持续腹痛
- B. 尿淀粉酶轻度升高
- C. 上腹部存在肌紧张反跳痛
- D. 患者体温轻度高
- E. 患者有腹胀

145. 为了确立诊断可选择的检查中，不包括（答案：E）

- A. 急诊B超检查
- B. 立位腹平片检查
- C. 血淀粉酶检查
- D. 诊断性腹腔穿刺检查
- E. 急诊上消化道钡餐检查

（146~147题共用题干）

男，54岁，反复脓血便半年，每天3-4次，在当地曾按痢疾治疗无明显效果。近一月出现腹胀，伴阵发性腹痛。查体：消瘦，腹稍胀，软，下腹轻压痛，右下腹可扪及一肿块，质较硬，尚可活动。

146. 根据上述资料，应诊断为（答案：E）

- A. 慢性菌痢
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 结肠息肉
- D. 肠结核
- E. 结肠癌

147. 首选的辅助检查（答案：D）

- A. 大便细菌培养
- B. CT
- C. 钡餐检查
- D. 纤维结肠镜检查
- E. B超

（148-150题共用题干）

女，43岁，右下腹持续性疼痛5天，伴恶心、呕吐，呕出物为胃内容物。体温38.5° C. 体检发现右下腹5cm55cm大小肿块，触痛明显

148. 最可能的诊断是（答案：D）

- A. 粪块所致肠梗阻

- B. 盲肠肿瘤
- C. 急性化脓性阑尾炎
- D. 阑尾周围脓肿
- E. 盲肠扭转

149. 此时较合适的处理是（答案：E）

- A. 急诊行阑尾切除术
- B. 急诊手术脓肿引流
- C. 肠道准备后行右半结肠切除术
- D. X线钡灌肠
- E. 暂不手术，保守治疗

150. 如果急诊手术，最合适的手术方式是：（答案：A）

- A. 脓肿引流
- B. 切除肿块
- C. 常规切除阑尾
- D. 右半结肠切除
- E. 一期肠吻合

（151-153题共用题干）

男，35岁，从高处跳下时，双下肢顿时感到无力

151. 急救运送的方法是（答案：E）

- A. 双人扶着让病人走
- B. 一人背着运送
- C. 一人抱着运送
- D. 一人抬头，一人抬脚运送
- E. 躺在木板床上运送

152. 在急诊室骨科首先做的影像学检查是（答案：D）

- A. MRI
- B. CT
- C. 核素骨扫描
- D. X线
- E. B型超声

153. 如果检查显示胸椎压缩性骨折超过1/3，并有骨块进入椎管，应采取的治疗方法是（答案：E）

- A. 牵引
- B. 仰卧硬板床，背部垫高
- C. 双桌法过伸复位
- D. 早期背伸锻炼

（154-155题共用题干）

女，45岁，四肢无力，站立不稳，进行性加重半年，无外伤史。查体：双下肢肌张力高、腱反射亢进。Hoffmann征（+），Babinski征（+）。



154. 其诊断为（答案：A）

- A. 脊髓型颈椎病
- B. 神经根型颈椎病
- C. 椎动脉型颈椎病
- D. 交感神经型颈椎病
- E. 混合型颈椎病

155. 应首先选择的治疗方法是（答案：B）

- A. 理疗
- B. 手术治疗
- C. 推拿按摩
- D. 颈枕带牵引
- E. 带围领和颈托

（156-157题共用题干）

男，50岁，2个月来间歇性无痛性全血尿，近3天来加重伴有血块，B型超声双肾正常，膀胱内有1.5cm×2.0cm×1.0cm新生物，有蒂

156. 为明确诊断最重要的检查是（答案：C）

- A. 尿常规
- B. 尿脱落细胞检查
- C. 膀胱镜检
- D. 静脉尿路造影
- E. CT

157. 目前最常用的治疗方法是（答案：B）

- A. 膀胱灌注化疗
- B. 经尿道电切
- C. 开放手术
- D. 放射治疗
- E. 全身化疗

（158-160题共用题干）

男，30岁，头部外伤6小时，伤后有一过性意识障碍，3小时后再次出现昏迷。检查左颞部头皮血肿，左瞳孔散大。CT扫描显示左侧颞叶硬膜外血肿。

158. 颅内出血的来源是（答案：C）

- A. 大脑前动脉
- B. 大脑中动脉
- C. 脑膜中动脉
- D. 颞浅动脉
- E. 枕动脉

159. 颞叶硬膜外血肿已引起（答案：D）

- A. 原发性脑水肿
- B. 继发性脑水肿
- C. 原发性脑干损伤
- D. 小脑幕切迹疝

E. 枕骨大孔疝

160. 首选治疗方案（答案：E）

A. 应用止血药

B. 应用脱水药

C. 钻孔引流术

D. 应用皮质激素类药物

E. 甘露醇脱水准备开颅