



中华人民共和国国家标准

GB/T 17980.94—2004

农 药

田间药效试验准则(二)

第 94 部分:杀菌剂防治柑橘脚腐病

Pesticide—
Guidelines for the field efficacy trials (II)—
Part 94: Fungicides against foot rot of citrus

2004-03-03 发布

2004-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

田间药效试验是农药登记管理工作重要内容之一,是制定农药产品标签的重要技术依据,而标签是安全、合理使用农药的唯一指南。为了规范农药田间试验方法和内容,使试验更趋科学与统一,并与国际准则接轨,使我国的药效试验报告具有国际认同性,特制定我国田间药效试验准则国家标准。该系列标准参考了欧洲及地中海植物保护组织(EPPO)田间药效试验准则及联合国粮农组织(FAO)亚太地区类似的准则,是根据我国实际情况并经过大量田间药效试验验证而制定的。

柑橘脚腐病是我国柑橘果树的重要病害之一,生产上经常需用杀菌剂进行防治。为确定防治柑橘脚腐病害药剂的最佳使用剂量,测试药剂对果树及非靶标有益生物的影响,为杀菌剂登记的药效评价和安全、合理使用技术提供依据,特制定 GB/T 17980 的本部分。

本部分是农药田间药效试验准则(二)系列标准之一,但本身是一个独立的部分。

本部分由中华人民共和国农业部提出。

本部分起草单位:农业部农药检定所。

本部分主要起草人:吴新平、白文星、刘乃炽、顾宝根、陈立平、林邦茂、张武军。

本部分由农业部农药检定所负责解释。

农 药

田间药效试验准则(二)

第 94 部分:杀菌剂防治柑橘脚腐病

1 范围

本部分规定了杀菌剂防治柑橘脚腐病(*Phytophthora parasitica*; *P. citrophthora*)田间药效试验的方法和要求。

本部分适用于杀菌剂防治柑橘脚腐病的登记用田间药效小区试验及评价。其他田间药效试验参照本部分执行。

2 试验条件

2.1 试验对象、作物和品种的选择

试验对象为脚腐病。

试验作物为柑橘。应选择以土柠檬或甜橙作砧木的敏感品种,记录品种名称、树龄和用药时的物候期。

2.2 环境条件

田间试验应选择在土质粘重、地下水位高、排水不良、管理粗放历年发病较重的密闭果园进行。所有试验小区的栽培条件(如土壤类型、肥料、树龄、株行距等)应一致,且符合当地科学的农业实践(GAP)。

3 试验设计和安排

3.1 药剂

3.1.1 试验药剂

注明药剂商品名或代号、通用名、中文名、剂型含量和生产厂家。试验药剂处理不少于三个剂量或依据协议(试验委托方与试验承担方签订的试验协议)规定的用药剂量。

3.1.2 对照药剂

对照药剂应是已登记注册的并在实践中证明是有较好药效的产品。对照药剂的类型和作用方式应同试验药剂相近并使用当地常用剂量,特殊情况可视试验目的而定。

3.2 小区安排

3.2.1 小区排列

试验药剂、对照药剂和空白对照的小区处理采用随机排列,特殊情况应加以说明。

3.2.2 小区面积和重复

小区面积:4株~6株树。

重复次数:最少4次重复。

3.3 施药方式

3.3.1 使用方式

按协议要求及标签说明进行。施药应与当地科学的农业实践相适应。通常柑橘脚腐病斑发生在柑橘的根茎部位,扩展蔓延至根群和近地面的主干。试验树用油漆编号,供试病斑用油漆标记。病斑处理的方法可用浅刮深刻法,即用刀刮病斑粗皮,然后纵刻(刀口深达木质部),条间距离为1cm涂药(不