



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 33415—2016

---

## 针灸异常情况处理

Handling methods for acupuncture abnormal conditions

2016-12-30 发布

2017-07-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家中医药管理局提出并归口。

本标准起草单位：天津中医药大学。

本标准主要起草人：郭义、何文菊、陈泽林、史丽萍、翟伟、任秋兰、赵雪、谭亚芹、杨毅、刘延祥、王娟、杨会杰、孔凡亮、马昕婷、刘亮。

# 针灸异常情况处理

## 1 范围

本标准规定了针灸异常情况的术语和定义、不良现象、处理方法。  
本标准适用于针灸异常情况的处理操作。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS 299—2008 乙型病毒性肝炎诊断标准

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 针灸异常情况 **acupuncture abnormal condition**

在针灸治疗过程中,由于术者操作不当或患者自身原因,发生的与治疗目的不相符合的不良现象。

### 3.2

#### 晕针 **fainting during acupuncture**

在针刺过程中,患者突然出现头晕目眩、面色苍白、心慌气短、倦怠乏力、恶心欲呕、身出冷汗,甚至晕厥的现象。

### 3.3

#### 滞针 **sticking of needle**

在行针或留针过程中,医者感觉针下滞涩,提插、捻转、出针均感困难,患者感觉疼痛的现象。

### 3.4

#### 弯针 **bending of needle**

将针刺入腧穴后,针身在体内形成弯曲的现象。

### 3.5

#### 折针 **breaking of needle**

在针刺过程中针身折断在肌体内的现象。

### 3.6

#### 后遗症 **lingering after acupuncture**

出针后,针刺局部仍遗留酸、胀、疼痛、麻木等不适的感觉。

### 3.7

#### 气胸 **pneumothorax**

针刺时刺破胸膜壁层或脏层,导致气体进入胸膜腔,引起咳嗽、呼吸困难等症状。